

# Flustad tabletki powlekane 0,2g +5mg x 12

Nasza cena: 9,31 zł

## Opis słownikowy

Dawka	0,2G+5MG
Opakowanie	*12
Postać	TABL.POWL.
Producent	Stada Arzneimittel Ag
Rejestracja	Lek bez recepty

## Opis produktu

### Opis

Flustad zawiera ibuprofen i fenylefryny chlorowodorek, które są skuteczne w łagodzeniu objawów grypy i przeziębienia, w tym bólu o nasileniu małym do umiarkowane go, przekrwienia błony śluzowej nosa (zatkany nos) oraz zmniejszają gorączkę.

Ibuprofen należy do grupy leków znanej jako niesteroidowe leki przeciwzapalne (tzw. NLPZ) i jest skuteczny w leczeniu bólu (w tym bólu głowy), obrzęków oraz może także obniżać gorączkę. Fenylefryny chlorowodorek (lek zmniejszający przekrwienie błony śluzowej nosa) zmniejsza obrzęk dróg nosowych, łagodziąc przekrwienie błony śluzowej nosa oraz zmniejszając ucisk, który może powodować ból głowy.

### Sposób użycia:

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletki należy połknąć w całości popijając wodą.

Ważne jest, aby podczas przeziębienia i grypy pić duże ilości płynów.

### Zalecana dawka:

#### Dorośli, osoby w podeszłym wieku oraz dzieci w wieku powyżej 12 lat:

Należy przyjmować 2 tabletki co 8 godzin. Należy zachować przynajmniej 4-godzinną przerwę pomiędzy kolejnymi dawkami oraz nie należy przyjmować więcej niż 6 tabletek w ciągu 24 godzin.

### Czas trwania leczenia:

Ten lek przeznaczony jest wyłącznie do krótkotrwałego stosowania. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę w możliwie najkrótszym czasie koniecznym do złagodzenia objawów.

**Dorośli:**

Leku Flustad nie stosować dłużej niż przez 5 dni.

**Młodzież i dzieci w wieku powyżej 12 lat:**

Leku Flustad nie stosować dłużej niż przez 3 dni.

Jeśli objawy choroby nie ustąpią lub nasilą się, należy skonsultować się z lekarzem.

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**