

# Formetic 1000 mg 60 tabletek

Nasza cena: 5,98 zł

## Opis słownikowy

Dawka	1000MG
Opakowanie	*60
Postać	Tabletki
Producent	POLPHARMA S.A. STAROGARD GDAŃSKI POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	METFORMINUM

## Opis produktu

### Opis

### Wskazania:

#### Produkt jest wskazany do stosowania w:

- leczenie cukrzycy typu 2,
- stanach przedcukrzycowych
- zespole policystycznych jajników

### Dawkowanie:

Dawka leku ustalana jest indywidualnie dla każdego pacjenta na podstawie przeprowadzonych badań.

#### Leczenie cukrzycy typu 2:

- zazwyczaj stosuje się dawkę wynoszącą 500 – 850mg w dawce podzielonej 2 – 3 razy na dobę,
- maksymalna dawka leku jaką można przyjmować w ciągu doby nie powinna przekraczać 3g przyjmowanych w 3 podzielonych dawkach.

#### Stan przedcukrzycowy:

- zazwyczaj stosuje się dawkę początkową wynoszącą 500 mg na dobę

## Zespół policystycznych jajników (ang. PCOS):

- zwykle stosowana dawka leku wynosi 500 mg 3 razy na dobę.

## Działanie:

- zmniejsza stężenie glukozy w osoczu zarówno na czczo, jak i po posiłku,

## Skład:

1 tabletkę powlekana zawiera 1000 mg metforminy chlorowodoru, co odpowiada 780 mg metforminy.

## Przeciwwskazania:

### Produktu nie należy stosować u pacjentów, u których występują dolegliwości związane z:

- nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
- kwasicą ketonową,
- stanem przedśpiączkowym w cukrzycy,
- niewydolnością nerek lub zaburzenia czynności nerek,
- odwodnieniem,
- ciężkim zakażeniem,
- wstrząsem,
- niewydolnością serca,
- niewydolnością oddechową,
- świeżo przeżytym zawałem mięśnia sercowego,
- niewydolnością wątroby,
- ostrym zatruciem alkoholem,
- alkoholizmem.

## Działania niepożądane:

Podczas stosowania leku mogą pojawiać się różnego rodzaju działania niepożądane.

### Najczęstszymi z nich są:

- zaburzenia smaku,
- zaburzenia żołądka i jelit,
- nudności,
- wymioty,
- biegunka,

- bóle brzucha
- utrata apetytu.

Jeżeli pacjent ma jakiegokolwiek wątpliwości co do stosowania leku powinien skonsultować się z lekarzem prowadzącym. Wszelkie niezbędne informacje zostały zawarte w ulotce informacyjnej, pacjent może również skonsultować się z farmaceutą wydającym lek.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.