

FortiLiver forte, 30 kapsułek



Nasza cena: 12,10 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*30
Postać	KAPS.
Producent	RANBAXY POLSKA [PL]
Rejestracja	Suplement diety

Opis produktu

Opis

FortiLiver forte, 30 kapsułek

FortiLiver forte 750 mg to suplement, który dostarcza organizmowi odpowiednią dawkę fosfolipidów - fosfatydylocholiny i fosfatydyloinozytol. Fosfolipidy są ważnym składnikiem budowy błony komórkowej, poza tym między innymi hamują procesy włóknienia w wątrobie, eliminują zły cholesterol czy uczestniczą w trawieniu tłuszczów.

Skład

Lecytyna sojowa (źródło fosfolipidów), żelatyna, stabilizator – sorbitol. Informacja o alergenach: zawiera surowce pochodzące z soi.

Zawartość składników w 2 kapsułkach:

lecytyna – 1500mg,
w tym fosfolipidy – 840mg: fosfatydylocholina – 150mg, fosfatydyloinozytol – 135mg.

Dawkowanie

Zalecana dzienna porcja dla dzieci powyżej 12. roku życia oraz dla osób dorosłych wynosi 2 kapsułki. Należy 1 kapsułkę używać 2 razy dziennie popijając obficie wodą.

Ważne informacje

Przed zastosowaniem w okresie ciąży i karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem.

Suplementu nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Nie zaleca się stosowania u osób z alergią na soję oraz jej przetwory.

Producent

Wyprodukowano w Hiszpanii dla:
Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.
ul. Kubickiego 11
02-954 Warszawa

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety. Zróżnicowana dieta i zdrowy tryb życia są niezbędne dla zachowania zdrowia. Suplementy należy przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla dzieci.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Nie należy spożywać po upływie daty minimalnej trwałości.