

## Furoxin, 630 mg, tabletki, 60 szt.



Nasza cena: 35,05 zł

### Opis słownikowy

Dawka	0,63 G
Opakowanie	*60
Postać	Tabletki
Producent	LEK-AM ZAKROCZYN P.F. POLSKA [PL]
Rejestracja	Suplement diety

### Opis produktu

#### Opis

Furoxin jest nowoczesnym preparatem stymulującym właściwe działanie układu moczowego. Furoxin zawiera dwa naturalne składniki, które wzajemnie uzupełniając swoje działanie przyczyniają się do zachowania prawidłowej funkcjonalności dróg moczowych.

#### Dawkowanie - Furoxin, 630 mg, tabletki, 60 szt.

1-2 tabletki powlekane dziennie podczas posiłku.

#### Składniki - Furoxin, 630 mg, tabletki, 60 szt.

(1 tabletki):

Ekstrakt z owoców żurawiny 300 mg,  
Ekstrakt z liści pokrzywy 100 mg.

Suchy ekstrakt etanolowo-wodny z owoców żurawiny (*Vaccinum macrocarpon*), zawierający nie mniej niż 10% proantocyjanów, suchy ekstrakt etanolowo-wodny z liści pokrzywy (*Urtica dioica*), celuloza, celuloza mikrokrystaliczna, stearynian magnezu, dwutlenek krzemu, hydroxypropylometyloceluloza, dwutlenek tytanu, talk, propylenowy glikol, lak czerwnieni koszełkowej.

#### Działania

- zmniejsza przyczepność bakterii do ścianek dróg moczowych, ułatwia ich wypłukiwanie i utrudnia rozwój bakterii w drogach moczowych
- wpływa na zwiększenie dobowej ilości wydalanego moczu
- zwiększa eliminację produktów przemiany materii
- wspomaga prawidłowy proces oddawania moczu
- działa korzystnie na utrzymanie prawidłowej kondycji dróg moczowych

#### Uwagi

Ostrzeżenie:

Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej. Nie należy stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Osoby ze schorzeniami nerek, przyjmujące leki moczopędne, kobiety w ciąży oraz karmiące piersią przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem.

**INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Nie należy spożywać po upływie daty minimalnej trwałości.