

FUSACID 20G 0,02 G/1G

Nasza cena: 27,48 zł

Opis słownikowy

Dawka	0,02 G/1G
Opakowanie	20g
Postać	KREM
Producent	CHEMA-ELEKTROMET SPÓŁDZ.PRACY RZESZÓW POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	ACIDUM FUSIDICUM

Opis produktu

Opis

Fusacid 0,02g/1g, krem 20 g

Skład:

1 g kremu zawiera 20 mg kwasu fusydynowego (Acidum fusidicum) w postaci kwasu fusydynowego półwodnego (20,3 mg).

Substancje pomocnicze wykazujące działanie biologiczne: propylu parahydroksybenzoesan (E 216), metylu parahydroksybenzoesan (E 218) i butylohydroksyanizol (E 320).

Wskazania do stosowania:

W miejscowym leczeniu zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na kwas fusydynowy, zwłaszcza *Staphylococcus aureus*.

Dawkowanie i sposób podawania:

Oczyszczoną, chorą powierzchnię skóry pokrywać niewielką ilością kremu 3 do 4 razy na dobę. Można również stosować krem pod ochronnym gazowym opatrunkiem, zmniejszając w takim przypadku częstość aplikacji do stosowania 1 lub 2 razy na dobę.

Przeciwwskazania:

- Nadwrażliwość na kwas fusydynowy i jego sole lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
- Zakażenia wywołane przez odporne drobnoustroje, a zwłaszcza *Pseudomonas aeruginosa*.

Działania niepożądane:

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

świąd, podrażnienia skóry, uczucie pieczenia, sucha skóra, wysypka (notowano różne rodzaje wysypki takie, jak rumieniowa, różyczka grudkowa i krostkowa), kontaktowe zapalenie skóry, wyprysk, rumień, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, obrzęk oczodołu.

Zaburzenia układu immunologicznego:

reakcje alergiczne

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.