

Gaviscon miętowy, tabletki do żucia, 16 sztuk



Nasza cena: 13,44 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*16
Postać	TABL.DO ZUCIA
Producent	Reckitt Benckiser Healthcare
Rejestracja	Lek bez recepty

Opis produktu

Opis

Gaviscon miętowy, tabletki do żucia, 16 sztuk

Lek Gaviscon o smaku mięty TAB należy do grupy leków nazywanych "środkami hamującymi refluks żołądkowo-przełykowy".

Dawkowanie - Gaviscon miętowy, tabletki do żucia, 16 szt.

Lek stosować doustnie. Dokładnie przeżuć tabletkę przed połyknięciem.

Dorośli w tym osoby w podeszłym wieku oraz dzieci w wieku 12 lat i powyżej: w przypadku wystąpienia objawów 2 do 4 tabletek po posiłkach i przed snem (do czterech razy na dobę).

Dzieci w wieku poniżej 12 lat: Podawać tylko po konsultacji z lekarzem.

Jeśli objawy nie ustąpią po 7 dniach leczenia, należy skonsultować się z lekarzem.

Składniki - Gaviscon miętowy, tabletki do żucia, 16 szt.

1 tabletkę zawiera:

250 mg alginianu sodu, 133,5 mg wodorowęglanu sodu oraz 80 mg węglanu wapnia.

Inne składniki: mannitol, makrogol 20000, kopowidon, aspartam, aromat mięty pieprzowej, magnezu stearynian oraz acesulfam potasowy.

Działania

Lek tworzy ochronną warstwę utrzymującą się na powierzchni treści żołądkowej zapobiegając cofaniu się kwaśnej treści żołądka, co powoduje ból i uczucie dyskomfortu w przełyku.

Wskazania - Gaviscon miętowy, tabletki do żucia, 16 szt.

Gaviscon o smaku mięty TAB jest stosowany w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego, takich jak odbijanie, zgaga i niestrawność, na przykład po posiłkach lub w czasie ciąży a także u pacjentów z objawami związanymi z refluksowym zapaleniem przełyku.

Przeciwwskazania - Gaviscon miętowy, tabletki do żucia, 16 szt.

Uczulenie na którykolwiek ze składników leku.

Przeciwwskazania - Gaviscon miętowy, tabletki do żucia, 16 szt.

Bardzo rzadko mogą wystąpić reakcje alergiczne na składniki leku. Mogą wystąpić objawy, takie jak wysypka skórna, świąd, trudności w oddychaniu, zawroty głowy, obrzęk twarzy, ust, języka lub gardła.

Uwagi

Ten lek można stosować podczas ciąży i karmienia piersią.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.