

## Gealcid, tabletki, 24 szt



Nasza cena: 10,37 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	*24
Postać	Tabletki
Producent	Glaxo Wellcome S.a.
Rejestracja	Lek bez recepty

### Opis produktu

#### Opis

Lek łagodzący uczucie zgagi.

Skład Gealcid:

(1 tabletki): Kwas alginowy 350 mg, wodorowęglan sodu 120 mg, wodorotlenek glinu 100 mg.

Substancje pomocnicze: sacharyna, talk, magnezu stearynian, aromat truskawkowy.

#### Działanie:

Gealcid to lek o działaniu zobojętniającym kwas solny i osłaniającym błonę śluzową przełyku, żołądka i dwunastnicy, w wyniku czego łagodzi dolegliwości bólowe występujące w nadkwaśności lub chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy.

Wodorotlenek glinu i wodorowęglan glinu mają działanie zobojętniające kwas solny w żołądku. Kwas alginowy w środowisku soku żołądkowego tworzy galaretkowaty żel, który chroni błonę śluzową żołądka i przełyku przed działaniem kwaśnej treści żołądkowej, zmniejszając w ten sposób możliwość podrażnienia.

#### Wskazania - Gealcid, tabletki, 24 szt:

Zgaga (pieczenie w przełyku), refluks żołądkowo-przełykowy (kwaśne odbijanie).

#### Dawkowanie - Gealcid, tabletki, 24 szt

dorośli i dzieci powyżej 12 lat - 2 tabletki. Najczęściej stosuje się dwie tabletki na jedną godzinę i trzy godziny po posiłku oraz przed snem lub w razie wystąpienia dolegliwości, zwykle 4 do 6 razy na dobę (maksymalnie 12 tabletek na dobę),

dzieci do 12 lat - 1 tabletki. Najczęściej stosuje się jedną tabletkę na godzinę lub trzy godziny po posiłku oraz przed snem, lub w razie wystąpienia dolegliwości, zwykle 4 do 6 razy na dobę (maksymalnie 6 tabletek na dobę).

Tabletkę przed połyknięciem należy dokładnie pogryźć do uzyskania papki. Nie należy stosować leku długotrwale. W czasie stosowania leku ograniczyć spożycie mleka i produktów mlecznych.

**Przeciwwskazania - Gealcid, tabletki, 24 szt:**

Nadwrażliwość na składniki leku, ciężka niewydolność nerek.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**