

Ginkofar Forte, 80 mg, tabletki, 60 szt



Nasza cena: 36,58 zł

Opis słownikowy

Dawka	80MG
Opakowanie	*60
Postać	Tabletki
Producent	BIOFARM SP.Z O.O.POZNAŃ POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	GINKGO BILOBA

Opis produktu

Opis

Kliniczne działanie preparatu Ginkofar forte polega na: usprawnieniu przepływu mózgowego oraz obwodowego w kończynach dolnych, ochronie komórek przed niedotlenieniem, hamowaniu agregacji płytek krwi i zwiększeniu płynności krwi.

Dawkowanie - Ginkofar Forte, 80 mg, tabletki, 60 szt

Ginkofar Forte podaje się doustnie. Preparat należy przyjmować po posiłku, popijając tabletkę płynem.

W zaburzeniach krążenia mózgowego lek stosuje się 2 do 3 razy na dobę po 1 tabletkę.

W zaburzeniach krążenia obwodowego lek stosuje się 2 razy na dobę po 1 tabletkę.

Zasadnicza terapia powinna trwać 8 do 12 tygodni. Po niej wskazane jest przyjmowanie leku 1 do 2 razy na dobę po 1 tabletkę.

Składniki - Ginkofar Forte, 80 mg, tabletki, 60 szt

1 tabletkę zawiera 80 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego, standaryzowanego na 24% ginkgoflawonoglikozydów, co odpowiada 19,2 mg ginkgo-flawonoglikozydów oraz następujące substancje pomocnicze: laktoza, poliwinylpirolidon, hydroksypropylometyloceluloza, stearynian magnezu, dwutlenek tytanu, glikol polietyle-nowy, dwutlenek krzemu koloidalny, tlenek żelaza.

Działania

Ginkofar forte zwiększa tolerancję tkankową, zwłaszcza mózgu na niedotlenienie, hamuje powstawanie obrzęku mózgu i siatkówki oraz przyspiesza resorpcję tych obrzęków. Lek hamuje uwarunkowaną wiekowo redukcję receptorów cholinergicznym, poprawia zdolność uczenia się i zapamiętywania. Znosi skurcz naczyń, zmniejsza lepkość krwi i agregację krwinek, dzięki czemu następuje zwiększenie mikrokrażenia tkankowego krwi.

Ekstrakt miłorzębu japońskiego neutralizuje wolne rodniki i działa neuroprotekcynie.

Wskazania - Ginkofar Forte, 80 mg, tabletki, 60 szt

Ginkofar forte stosuje się w zaburzeniach: krążenia mózgowego z następującymi objawami: utrudniona koncentracja myślowa, zaburzenia pamięci, zawroty i bóle głowy, szum w uszach; krążenia obwodowego, któremu towarzyszą zaburzenia w ukrwieniu kończyn dolnych - uczucie zimna i bólu w stopach, osłabienie słuchu i wzroku. Preparat Ginkofar forte stosuje się pomocniczo w miażdżycy naczyń.

Przeciwwskazania - Ginkofar Forte, 80 mg, tabletki, 60 szt

Alergia na składniki preparatu i zła tolerancja leku.

Przeciwwskazania - Ginkofar Forte, 80 mg, tabletki, 60 szt

Rzadko występują dolegliwości żołądkowo-jelitowe. U osób nadwrażliwych mogą wystąpić bóle głowy lub wysypki skórne o charakterze alergicznym.

Interakcje

Wyciąg z liści miłorzębu japońskiego nie powinien być stosowany jednocześnie podczas długoterminowej terapii aspiryną, warfaryną oraz diuretykami tiazydowymi.

Uwagi

Lek jest bezpieczny i jego stosowanie nie wymaga zachowania żadnych specjalnych środków ostrożności.

Stosowanie leku podczas ciąży i karmienia piersią:

Nie są znane niekorzystne działania leku na płód i dzieci karmione piersią. Z tytułu prewencji ogólnej podczas ciąży i karmienia piersią należy przerwać stosowanie leku Ginkofar forte.

Wpływ leku na zdolność kierowania pojazdami mechanicznym oraz sprawność psychofizyczną:

Ginkofar forte nie wywiera ujemnego wpływu na sprawność psychofizyczną oraz na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.