

Ginkofar, tabletki, 40 mg, 60 szt.



Nasza cena: 28,11 zł

Opis słownikowy

Dawka	40MG
Opakowanie	*60
Postać	Tabletki
Producent	BIOFARM SP.Z O.O.POZNAŃ POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	GINKGO BILOBA

Opis produktu

Opis

Ginkofar stosuje się w leczeniu i profilaktyce zaburzeń krążenia mózgowego i obwodowego, miażdżycy naczyń.

Dawkowanie - Ginkofar, tabletki, 40 mg, 60 szt.

Ginkofar przyjmuje się doustnie 3 razy dziennie po jednej tabletkie, po posiłku, popijając tabletkę płynem. Terapia powinna trwać 8-12 tygodni. Pierwsze objawy poprawy występują zwykle po około 4 tygodniach kuracji. Po kuracji zasadniczej, wskazane jest dalsze przyjmowanie leku 2 razy dziennie po 1 tabletkie. Ginkofar jest lekiem dobrze tolerowanym i może być podawany przez dłuższy czas.

Składniki - Ginkofar, tabletki, 40 mg, 60 szt.

1 tabletki: 40 mg wyciągu suchego z liści miłorzębu japońskiego, standaryzowanego na zawartość 24% ginkgoflawonoglikozydów i 6% laktonów terpenowych oraz substancje pomocnicze.

Działania

Lek Ginkofar zawiera wyciąg z liści miłorzębu japońskiego. Zawarty w nim zespół substancji czynnych zwiększa tolerancję tkankową, zwłaszcza mózgu na niedotlenienie. Lek hamuje uwarunkowaną wiekowo redukcję receptorów cholinergicznym i adrenergicznym alfa2, poprawia zdolność uczenia się i zapamiętywania. znosi skurcz naczyń, zmniejsza lepkość krwi i agregację krwinek, dzięki czemu następuje zwiększenie mikrokrażenia tkankowego krwi. Ekstrakt z liści miłorzębu japońskiego neutralizuje wolne rodniki oraz działa neuroprotekcynnie. Kliniczne działanie leku Ginkofar polega na:

- zmniejszeniu niedokrwienia mózgu,
- usprawnieniu przepływu mózgowego oraz obwodowego w kończynach dolnych,
- ochronie komórek przed niedotlenieniem,
- hamowaniu agregacji płytek krwi i zwiększeniu płynności krwi.

Wskazania - Ginkofar, tabletki, 40 mg, 60 szt.

Ginkofar stosuje się w leczeniu i profilaktyce zaburzeń krążenia mózgowego i obwodowego, miażdżycy naczyń i związanych z tym objawach takich jak:

- utrudniona koncentracja myślowa i zaburzenia pamięci,
- zawroty i bóle głowy,
- szum w uszach,
- zaburzenia w ukrwieniu kończyn dolnych (uczucie zimna i bóle w stopach),
- osłabienie słuchu i wzroku.

Przeciwwskazania - Ginkofar, tabletki, 40 mg, 60 szt.

Nadwrażliwość na składniki leku, zła tolerancja leku.

Przeciwwskazania - Ginkofar, tabletki, 40 mg, 60 szt.

Rzadko pojawiać się mogą dolegliwości żołądkowo-jelitowe. U osób szczególnie wrażliwych mogą wystąpić bóle głowy lub wysypki skórne o charakterze alergicznym.

Uwagi

Lek jest bezpieczny i jego stosowanie nie wymaga zachowania żadnych specjalnych środków ostrożności.

Stosowanie leku podczas ciąży i karmienia piersią: nie są znane niekorzystne działania wyciągu z miłorzębu na płód i noworodka. Z przyczyn ogólnolekarskich leku Ginkofar nie należy stosować w czasie ciąży i karmienia piersią.

Wpływ leku na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi: Ginkofar nie wywiera ujemnego wpływu na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi.

Interakcje: wyciąg z liści miłorzębu japońskiego nie powinien być stosowany jednocześnie podczas długoterminowej terapii aspiryną, warfaryną oraz diuretykami tiazydowymi.

Przedawkowanie:

Po przedawkowaniu jednorazowym lub wielokrotnym mogą wystąpić dolegliwości żołądkowo-jelitowe, goniowa myśli oraz bóle głowy.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.