

# Glibetic 3 mg 30 tabletek

Nasza cena: 5,76 zł

## Opis słownikowy

Dawka	3MG
Opakowanie	*30
Postać	Tabletki
Producent	POLPHARMA S.A. STAROGARD GDAŃSKI POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	GLIMEPIRIDUM

## Opis produktu

### Opis

### Wskazania:

Produkt jest przeznaczony do stosowania w leczeniu cukrzycy typu 2, gdy dieta, ćwiczenia fizyczne oraz zmniejszenie masy ciała nie są wystarczająco skuteczne.

### Dawkowanie:

Szczegółowe dane na temat stosowania leku znajdują się w ulotce informacyjnej dołączonej do opakowania. Jednakże lek ten powinien być zawsze stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza i pod jego ścisłą kontrolą. Dawkowanie zależy od wyników badań oraz stężenia glukozy we krwi i moczu.

- początkowo należy podawać lek w najmniejszej dostępnej dawce wynoszącej 1mg na dobę
- jeżeli po zastosowaniu dawki początkowa nie widać poprawy, dawkę tę należy zwiększać w odstępach 1 – 2 tygodniowych do osiągnięcia maksymalnej dawki 4mg glimepirydu.

### Działanie:

- stymuluje wydzielanie insuliny przez komórki beta trzustki,
- obniża poziom cukru we krwi,
- zwiększa wrażliwość komórek organizmu na insulinę.

## Skład:

1 tabletkę zawiera 3 mg glimepirydu.

## Przeciwwskazania:

### Glibeticu nie należy stosować następujących przypadkach:

- nadwrażliwość na substancję czynną, inne pochodne sulfonilomocznika lub sulfonamidu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,
- cukrzyca typu 1 (insulinozależna),
- śpiączka cukrzycowa,
- kwasica ketonowa,
- ciężkie zaburzenie czynności nerek lub wątroby,
- u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.

## Działania niepożądane:

Podczas stosowania leku mogą występować różnego rodzaju działania niepożądane. Istotną informacją jest iż działania niepożądane mogą nie występować w ogóle bądź też ich intensywność jest różna w zależności od pacjenta.

- trombocytopenia,
- leukopenia,
- niedokrwistość,
- granulocytopenia,
- agranulocytoza,
- niedokrwistość hemolityczna
- łagodne reakcje nadwrażliwości.
- nadwrażliwość krzyżowa na pochodne sulfonilomocznika,
- hipoglikemia.
- zaburzenia widzenia.
- nudności,
- wymioty
- biegunka,
- zaburzenia czynności wątroby
- zmniejszenie stężenia sodu w surowicy.

Więcej informacji na temat działań niepożądanych zostało zawartych w ulotce informacyjnej dołączonej do opakowania. Jeżeli pacjent ma jakiegokolwiek wątpliwości co do stosowania leku powinien niezwłocznie skonsultować się z lekarzem prowadzącym.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.