

Glucophage XR 500 mg, 60 tabletek

Nasza cena: 14,28 zł

Opis słownikowy

Dawka	500MG
Opakowanie	*60
Postać	Tabletki
Producent	Merck Sante Francja [Fr]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	METFORMINUM

Opis produktu

Opis

Glucophage XR 500 mg, 60 tabletek

Lek przeciwcukrzycowy.

Wskazania do stosowania

Leczenie cukrzycy typu 2 u dorosłych, zwłaszcza u pacjentów otyłych, gdy za pomocą ściśle przestrzeganej diety i ćwiczeń fizycznych nie można uzyskać prawidłowego stężenia glukozy we krwi.

GLUCOPHAGE XR można stosować w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub z insuliną.

U pacjentów z cukrzycą typu 2 i nadwagą leczonych metforminą jako lekiem pierwszego rzutu w razie nieskuteczności diety wykazano zmniejszenie ilości powikłań cukrzycy

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na chlorowodorek metforminy lub jakiegokolwiek inny składnik preparatu, kwasica ketonowa lub stan przedśpiączkowy w przebiegu cukrzycy, niewydolność nerek (klirens kreatyniny < 60 ml/min), ostre stany wiążące się z ryzykiem niewydolności nerek: odwodnienie, ciężkie zakażenia, wstrząs, konieczność dożylnego podania środków cieniujących zawierających jod, ostre lub przewlekłe choroby mogące być przyczyną niedotlenienia tkanek, (niewydolność serca lub niewydolność oddechowa, świeży zawał mięśnia sercowego, wstrząs), niewydolność wątroby, ostre zatrucie alkoholem, alkoholizm, karmienie piersią.

Skład

1 tabletki o przedłużonym uwalnianiu powlekana zawiera 750 mg lub 500 mg substancji czynnej - chlorowodoru metforminy

([metformini hydrochloridum](#)) oraz substancje pomocnicze: stearynian magnezu, karmelozę sodową oraz hypromelozę.

Dawkowanie Glucophage XR 500 mg, 60 tabletek

Doustnie. Lekarz dostosuje dawkę na podstawie wyników badań stężenia glukozy we krwi.

Działania niepożądane

Najczęściej mogą wystąpić zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego: nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha i zmniejszenie łaknienia (> 10%). Objawy te zwykle występują na początku leczenia i przeważnie samoistnie ustępują w czasie dalszego stosowania - w czasie leczenia postacią metforminy o przedłużonym działaniu - XR - są one rzadsze niż w czasie stosowania postaci standardowej. Powolne zwiększanie dawki może poprawić tolerancję leku. Często występują zaburzenia smaku, natomiast bardzo rzadko: łagodny rumień czy zmniejszenie absorpcji i stężenia w osoczu witaminy B12 (w związku z długotrwałym leczeniem).

Środki ostrożności

Rzadko występującym, lecz groźnym zaburzeniem może być wystąpienie kwasicy mleczanowej. Ryzyku jej wystąpienia można i należy zapobiegać kontrolując inne czynniki ryzyka, jak: źle wyrównana cukrzyca, kwasica ketonowa, długotrwałe głodzenie, nadużywanie alkoholu, niewydolność wątroby, niedotlenienie. Przed rozpoczęciem leczenia oraz regularnie w czasie leczenia, należy oznaczać stężenie kreatyniny w surowicy.

W przypadku badań radiologicznych z zastosowaniem środków cieniujących zawierających jod, podawanych dożylnie (np. urografi a, angiografi a), metforminę należy odstawić przed badaniem.

W przypadku planowanego zabiegu chirurgicznego ze znieczuleniem ogólnym, metformina powinna być odstawiona na 48 godzin przed zabiegiem. Podawanie metforminy można wznowić nie wcześniej niż po 48 godzinach po zabiegu.

Interakcje Glucophage XR 500 mg, 60 tabletek

W czasie leczenia nie należy spożywać alkoholu ani stosować środków kontrastowych zawierających jod. Metforminę należy stosować ostrożnie z glikokortykosteroidami, które mają działania hiperglikemiczne, jak i inhibitorami konwertazy angiotensyny, które mogą obniżać glikemię. Metformina nie wywołuje hipoglikemii, jednak w czasie jednoczesnego stosowania insuliny lub pochodnych sulfonylomocznika może wystąpić nadmierne zmniejszenie stężenia glikemii.

Ciąża i karmienie piersią Glucophage XR 500 mg, 60 tabletek

W przypadku planowania ciąży, jak i w czasie ciąży nie należy stosować metforminy.

Ze względu, iż nie przeprowadzono odpowiednich badań u kobiet w okresie karmienia piersią, należy podjąć decyzję czy odstawić metforminę, czy też przerwać karmienie piersią.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.