

Glucophage XR 750 mg, 60 tabletek

Nasza cena: 19,64 zł

Opis słownikowy

Dawka	750MG
Opakowanie	*60
Postać	Tabletki
Producent	Merck Sante Francja [Fr]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	METFORMINUM

Opis produktu

Opis

Glucophage XR 750 mg, 60 tabletek

Wskazania:

Lek należy stosować u pacjentów u których:

- występuje cukrzyca typu 2 u dorosłych, zwłaszcza u pacjentów z nadwagą.
- w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insuliną.
- w zapobieganiu cukrzycy typu 2 u pacjentów ze [stanem przedcukrzycowym](#).
- [zespół policystycznych jajników](#) (ang. [PCOS](#)).

Dawkowanie:

Dawka leku jest ustalana indywidualnie dla każdego pacjenta, lek powinien być stosowany pod ścisłą kontrolą lekarza prowadzącego.

Zaleca się stosować dawkę 1000 mg – 2 razy dziennie czyli 2 g dziennie. Maksymalna dawka wynosi nie więcej niż 3 g na dobę.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej dawki do spożycia.

Działanie:

- poprawia tolerancję glukozy w cukrzycy typu 2 poprzez zmniejszanie wytwarzania glukozy w wątrobie,

- zwiększanie wrażliwości tkanek na insulinę (zwiększa obwodowy wychwyt i tkankowe zużycie glukozy) i hamowanie wchłaniania glukozy.
- nie powoduje hipoglikemii (zarówno u osób chorych na cukrzycę, jak i zdrowych) ani hiperinsulinemii.
- wchłania się w 50%, osiąga maksymalne stężenie po 2,5 godzinach od zastosowania,
- nie jest metabolizowana,
- wydalana jest przez nerki.

Skład Glucophage XR 750 mg, 60 tabletek

1 tabletko o przedłużonym uwalnianiu zawiera 750 mg metforminy.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku jeżeli u pacjentów występuje:

- Nadwrażliwość na składniki preparatu,

Bezwzględne:

- choroby nerek,
- niewydolność nerek;
- stany będące potencjalnym zagrożeniem dla czynności nerek,
- niewydolność serca, ciężkie zakażenia,
- badania z użyciem środków cieniujących zawierających jod,
- ostra lub przewlekła kwasica metaboliczna,
- stan przedśpiączkowy,
- śpiączka cukrzycowa hipermolarna i ketonowa,
- choroby wątroby,
- świeży zawał serca,
- niewydolność serca,
- niewydolność oddechowa,
- stany niedotlenienia i nasilonego katabolizmu,
- powikłania cukrzycy,
- ciężkie zakażenia,
- zabieg operacyjny,
- nadużywanie alkoholu,
- podeszły wiek,

- dzieci.

Działania niepożądane:

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi występującymi podczas stosowania leku są:

- kwasica mleczanowa
- biegunka,
- nudności,
- wymioty,
- wzdęcia,
- bóle brzucha,
- brak apetytu,
- metaliczny posmak w ustach.

W przypadku przedłużającej się biegunki lub wymiotów lek należy odstawić (zagrożenie odwodnieniem).

W celu zapoznania się z szerszymi działaniami niepożądanymi należy sięgnąć do ulotki informacyjnej dołączonej do opakowania bądź też skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.