

Gripex Control 12 tabletek

Nasza cena: 16,10 zł



Opis słownikowy

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Opakowanie | *12 |
| Postać | Tabletki |
| Producent | US PHARMACIA SP. Z O.O. POLSKA [PL] |
| Rejestracja | Lek bez recepty |
| Substancja czynna | PARACETAMOLUM, COFFEINUM |

Opis produktu

Opis

Gripex Control 12 tabletek

Lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy.

Zawiera dwie substancje czynne: paracetamol - działający przeciwbólowo i przeciwgorączkowo oraz wzmacniającą to działanie kofeinę.

Lek wskazany przy różnego rodzaju bólach - mięśni, stawów lub menstruacyjnych oraz przy pierwszych objawach przeziębienia i grypy.

Składniki

Substancje czynne: paracetamol (Paracetamolum) i kofeina (Coffeinum).

W 1 tabletkie znajduje się 500 mg paracetamolu i 50 mg kofeiny.

Substancje pomocnicze: powidon, skrobia ziemniaczana, celuloza mikrokryształiczna, karboksymetyloskrobia sodowa, talk, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletki Gripex Control należy stosować doustnie, najlepiej na czczo, aby lek zaczął szybciej działać. Linia podziału na tabletkie ułatwia tylko jej rozkruszenie, w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki.

Dawkowanie Gripexu Control dla dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat to 1-2 tabletki co 4-6 godzin (maksymalnie 8 tabletek na dobę).

Działanie

Gripex Control działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Paracetamol zwalcza gorączkę, ból głowy, ból gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe. Natomiast kofeina wzmacnia i przyspiesza działanie przeciwbólowe paracetamolu, wykazuje działanie pobudzające.

Wskazania

Lek wskazany przy następujących dolegliwościach:

- bóle mięśniowe, stawowe i kostne różnego pochodzenia,
- bóle głowy,
- migrena,
- nerwobóle,
- bóle zębów,
- bóle menstruacyjne,
- bóle pourazowe,
- bóle pooperacyjne,
- bóle nowotworowe o niewielkim lub umiarkowanym natężeniu,
- stany gorączkowe wynikające z przeziębienia, grypy oraz stanów grypopodobnych.

Przeciwwskazania

Nie stosować Gripexu Control u osób z uczuleniem na substancje czynne lub którykolwiek składnik leku. Do przeciwwskazań należą również: wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozy-6- fosforanowej i reduktazy methomoglobinowej, choroba alkoholowa, ciężka niewydolność wątroby lub nerek, zaburzenia rytmu serca.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpią poniższe objawy nie należy przyjmować leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Są to stany zagrażające życiu. Występujące rzadko - skórne reakcje alergiczne, tj. pokrzywka, wysypka.

Występujące bardzo rzadko - ciężkie reakcje skórne: wysypka z krostami na całym ciele lub nadżerki w jamie ustnej, oczach, narządach płciowych i na skórze albo pękające olbrzymie pęcherze, złuszczenie dużych płatów naskórka, przebiegające z osłabieniem, gorączką i bólami stawowymi.

Rzadko występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 1000 osób): agranulocytoza (bardzo znaczne zmniejszenie liczby lub brak krwinek białych); nudności, wymioty, zaburzenia trawienia.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 10 000 osób): małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi); kolka nerkowa, martwica brodawek nerkowych, ostra niewydolność nerek.

Częstość nieznana: przyspieszenie akcji serca; bezsenność, niemożność skupienia uwagi, drażliwość, drżenia mięśniowe.

Środki ostrożności

Lek zawiera paracetamol, więc aby uniknąć jego przedawkowania należy zwrócić uwagę na skład innych produktów leczniczych przyjmowanych podczas stosowania Gripexu Control.

Stosowanie leku przez osoby z niewydolnością wątroby, nadużywające alkoholu oraz głodzone stwarza ryzyko uszkodzenia wątroby. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u osób głodzonych i regularnie pijących alkohol.

Ostrożnie stosować u osób z niewydolnością nerek, astmą oskrzelową, nadczynnością gruczołu tarczowego, zaburzeniami snu w

postaci bezsenności.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Leku nie należy stosować równocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol i kofeinę.

Gripex Control może wchodzić w interakcje z:

doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi,
doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi,
ryfampicyną,
lekami przeciwpadaczkowymi,
lekami uspokajającymi i nasennymi,
inhibitorami MAO (również przez okres 2 tygodni od zaprzestania ich stosowania),
zydowudyną,
sympatykomimetykami (zmniejszające przekrwienie, hamujące apetyt i leki psychostymulujące podobne do amfetaminy),
hormonami tarczycy,
doustnymi środkami antykoncepcyjnymi,
cymetydyną,
chloramfenikolem,
chinolonem,
werapamilem.

Stosowanie leku z jedzeniem i pićciem

W czasie przyjmowania Gripexu Controlnie wolno pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie stosować w I trymestrze ciąży. W II i III trymestrze przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Nie stosować w okresie karmienia piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Nie podawać Gripexu Control dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.