

## Gripex HotMax, 8 saszetek



Nasza cena: 25,33 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	*8
Postać	Saszetki
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	PARACETAMOLUM, ACIDUM ASCORBICUM, PHENYL

### Opis produktu

#### Opis

Preparat łagodzi objawy przeziębienia i grypy.

#### Dawkowanie - Gripex HotMax saszetki x 8

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 saszетка co 4 do 6 godzin (maksymalnie 4 saszetki na dobę). Zawartość należy rozpuścić w szklance gorącej wody.

#### Składniki - Gripex HotMax saszetki x 8

1 saszетка zawiera:

substancje czynne: paracetamol 1000 mg, kwas askorbowy 100 mg, chlorowodorek fenylefryny 12,2 mg

#### Działania

Gripex HotActiv Forte to lek wieloskładnikowy o działaniu przeciwgorączkowym, przeciwbólowym i udrażniającym nos. Łagodzi objawy przeziębienia i grypy.

#### Wskazania - Gripex HotMax saszetki x 8

Wskazaniem do stosowania leku jest krótkotrwałe łagodzenie objawów przeziębienia, grypy i zakażeń grypopodobnych, takich jak: gorączka, bóle głowy, gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe oraz objawów obrzęku błony śluzowej nosa występujących w przeziębieniu, grypie.

#### Przeciwwskazania - Gripex HotMax saszetki x 8

Nie stosować leku:

- jeśli wcześniej występowały objawy uczulenia na którykolwiek składnik leku,
- jeśli występują następujące schorzenia: niestabilna choroba wieńcowa, zaburzenia rytmu serca, wysokie ciśnienie tętnicze, wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej, ciężka niewydolność nerek lub wątroby, wirusowe zapalenie wątroby, choroba alkoholowa, fenylketonuria, jaskra z wąskim kątem przesączania, nadczynność tarczycy,
- w czasie stosowania leków z grupy inhibitorów MAO i okresie do 2 tygodni od zaprzestania przyjmowania tych leków
- w skojarzeniu z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi,
- w czasie przyjmowania zydowudyny,
- u dzieci w wieku poniżej 12 lat,
- w okresie ciąży i karmienia piersią.

## Przeciwwskazania - Gripex HotMax saszetki x 8

Jak każdy lek, Gripex HotActive Forte może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Należą do nich:

- zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: reakcje alergiczne (świąd, pokrzywka)
- zaburzenia układu immunologicznego: reakcje nadwrażliwości aż do objawów wstrząsu anafilaktycznego (objawiającego się zaburzeniami świadomości, białą skórą, spadkiem ciśnienia krwi, poceniem, wytwarzaniem małej ilości moczu, przyspieszonym oddechem, obrzękami)
- zaburzeniami żołądka i jelit: nudności, wymioty, zaburzenia trawienia, pieczenie w nadbrzuszu, suchość w jamie ustnej
- zaburzenia układu krążenia: podwyższenie ciśnienia tętniczego, tachykardia (przyspieszone bicie serca), zaburzenia rytmu serca, białą skórą
- zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: zaburzenia oddychania, napad astmy oskrzelowej
- zaburzenia nerek i dróg moczowych: zaburzenia oddawania moczu, kolka nerkowa, martwica brodawek nerkowych
- zaburzenia układu nerwowego: niepokój, bezsenność
- zaburzenia psychiczne: omamy, lęk, nerwowość
- zaburzenia krwi i układu chłonnego: granulocytopenia (zmniejszona liczba jednego rodzaju krwinek białych we krwi), agranulocytoza (brak jednego rodzaju krwinek białych we krwi, trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi).

## Uwagi

Lek może zmniejszać zdolność koncentracji i upośledzać czas reakcji. Dlatego w czasie stosowania leku należy zachować ostrożność w trakcie prowadzenia samochodu i obsługiwanie urządzeń mechanicznych.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**