

## Grippokaps, 12 kapsułek



Nasza cena: 7,06 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	*12
Postać	KAPS.
Producent	Hasco-Lek, Wrocław
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Psychotrop

### Opis produktu

#### Opis

Preparat łagodzi objawy przeziębienia i grypy.

#### Dawkowanie - Grippokaps, 12 kapsułek

Lek stosuje się doustnie. Dorośli i dzieci powyżej 12 lat - 2 kapsułki co 4-6 godzin, maksymalnie 8 kapsułek na dobę. Dzieci w wieku 6-12 lat - 1 kapsułka co 6 godzin, maksymalnie 4 kapsułki na dobę.

#### Składniki - Grippokaps, 12 kapsułek

Paracetamol 250 mg, chlorowodorek pseudoefedryny 30 mg. Substancje pomocnicze: Makroglol 400, glicerol, glikol propylenowy, powidon K-15/17, woda oczyszczona

Skład otoczki: Żelatyna, glicerol, sorbitol, czerwień koszenilowa E 124, żółcień chinolinowa E 104, woda oczyszczona.

#### Działania

Przeciwbólowe, przeciwgorączkowe (prawdopodobnie hamuje produkcję prostaglandyn w podwzgórzu), zmniejsza przekrwienie błon śluzowych górnych dróg oddechowych,

#### Wskazania - Grippokaps, 12 kapsułek

Lek Grippokaps stosuje się w leczeniu objawów grypy i zakażeń grypopodobnych, przebiegających z gorączką oraz bólami głowy, bólami mięśniowymi i kostno-stawowymi, jak również w leczeniu objawów zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych. Lek może być stosowany u pacjentów, u których stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych i pochodnych kwasu acetylosalicylowego jest niewskazane.

## Przeciwwskazania - Grippokaps, 12 kapsułek

- nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku
- stosowanie inhibitorów MAO i do 2 tyg. od zaprzestania ich przyjmowania
- ciężkie zaburzenia czynności wątroby i nerek
- niedobór dehydrogenazy gluzoko-6-fosforanowej
- niedokrwistość
- nadciśnienie tętnicze i choroby niedokrwienne serca
- choroba alkoholowa
- dzieci poniżej 12 roku życia.

## Przeciwwskazania - Grippokaps, 12 kapsułek

Działania niepożądane paracetamolu stosowanego w dawkach terapeutycznych występują rzadko i obejmują przemijające dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, skórne reakcje uczuleniowe. Bardzo rzadko występuje trombocytopenia, leukopenia, agranulocytoza oraz nefrotoksyczność.

Pseudoefedryna rzadko wywołuje działania niepożądane. Najbardziej znane obejmują tachykardię, niepokój ruchowy i bezsenność, wysypka skórna, zatrzymanie moczu, zaburzenia snu, omamy, podwyższenie ciśnienia w krążeniu płucnym i komorowe zaburzenia rytmu, również pozastosowaniu w dawkach terapeutycznych.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**