


Groprinosin Forte, syrop 150 ml



Nasza cena: 28,66 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	150 ML (BUTELKA)
Postać	SYROP
Producent	GEDEON RICHTER POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	INOSINUM

Opis produktu

Opis

Groprinosin jest lekiem przeciwwirusowym i zwiększającym odporność organizmu (pobudza czynność układu odpornościowego).

Wskazania:

Wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. W leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex). Może być stosowany jedynie u pacjentów, u których w przeszłości rozpoznano zakażenie wirusem opryszczki pospolitej.

Składniki:

1 ml syropu zawiera: substancję czynną leku: inozyny pranobeks (50 mg/ml); pozostałe składniki: sacharoza, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, woda oczyszczona, sacharyna sodowa, glicerol, etanol 96% oraz aromat malinowy L-144739 (cukier, glikol propylenowy, etanol, naturalna substancja zapachowa).

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lek należy stosować doustnie.

Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat): zalecana dawka dobową wynosi 50 mg/kg masy ciała na dobę (1 ml syropu na 1 kg masy ciała na dobę), zwykle 3 g (czyli 60 ml syropu) na dobę, podawane w 3 lub 4 dawkach podzielonych. Dawka maksymalna wynosi 4 g inozyny pranobeks na dobę (czyli 80 ml syropu/dobę).

Dzieci w wieku powyżej 1 roku życia: zazwyczaj zalecana dawka wynosi 50 mg/ kg masy ciała/dobę (1 ml syropu na 1 kg masy ciała na dobę) w 3 lub 4 równych podzielonych dawkach podawanych w ciągu doby: dla dzieci o wadze 10-14kg: 3x5ml syropu; dla dzieci o

wadze 15-20kg: 1x5 do 7,5ml syropu; dla dzieci o wadze 21-30kg: 3x7,5 do 10ml syropu; dla dzieci o wadze 31-40kg: 3x10 do 15ml syropu; dla dzieci o wadze 41-50kg: 3x15 do 17,5ml syropu.

Przeciwwskazania:

Jeśli pacjent ma uczulenie na inozyny pranobeks lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Objawami reakcji alergicznej mogą być: wysypka, świąd, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka. Jeśli u pacjenta występuje aktualnie napad dny moczanowej (silny ból stawu z obrzękiem i zaczerwienieniem skóry lub też w obrębie dużych stawów dochodzi do wystąpienia wysięku) lub badania wykazały zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi).

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Każdy lek może wywołać reakcję alergiczną, jednakże ciężkie reakcje alergiczne po przyjęciu leku Gropinosin występują bardzo rzadko.

Należy natychmiast skonsultować się z lekarzem, jeżeli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów:

- nagle pojawiający się świszczący oddech
- trudności w oddychaniu
- obrzęk powiek, twarzy, warg
- wysypka lub świąd (zwłaszcza jeśli dotyczą całego ciała).

Bardzo często (występuje częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

- zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi lub w moczu

Często (występują u 1 do 10 osób na 100):

- podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych lub stężenia azotu mocznikowego we krwi
- bóle głowy
- zawroty głowy
- zmęczenie lub złe samopoczucie
- nudności z wymiotami lub bez
- ból brzucha
- świąd skóry
- wysypka skórna (jako jedyny objaw)
- bóle stawów

Niezbyt często (występują u 1 do 10 osób na 1000):

- senność lub trudności w zasypianiu (bezsenna)
- biegunka
- zaparcia
- wielomocz (zwiększona ilość wydalanego moczu)
- nerwowość

Częstość nieznaną (nie może być określana na podstawie dostępnych danych):

- ból w nadbrzuszu
- obrzęk twarzy, warg, powiek lub gardła (obrzęk naczyńworuchowy)
- pokrzywka
- reakcja alergiczna
- reakcja alergiczna dotycząca całego ciała (reakcja anafilaktyczna)
- wstrząs anafilaktyczny
- zawroty głowy
- zaczerwienienie skóry (rumień)

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku Groprinosin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

- Jeśli u pacjenta w przeszłości występowały napady dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego w krwi lub w moczu. Lek Groprinosin może bowiem wywoływać przemijające zwiększenie stężenia kwasu moczowego w krwi i w moczu.
- Jeśli u pacjenta występowała w przeszłości kamica nerkowa.
- Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek. W takim przypadku lekarz będzie uważnie kontrolował pacjenta. Jeśli leczenie jest długotrwałe (3 miesiące lub dłużej), lekarz zleci regularne badania kontrolne krwi oraz będzie kontrolować czynność nerek i wątroby.
- Podczas długotrwałego leczenia mogą tworzyć się kamienie nerkowe.
- Jeśli zaobserwowano objawy reakcji alergicznej, takiej jak wysypka, świąd, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka. W takim przypadku należy natychmiast przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem.
- Nie należy stosować leku u dzieci poniżej 1. roku życia.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.