

Grypolek, tabletki powlekane, 12 tabletek



Nasza cena: 8,65 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*12
Postać	TABL.POWL.
Producent	Kato Labs Sp. Z O.o.
Rejestracja	Lek bez recepty

Opis produktu

Opis

Preparat łagodzi objawy przeziębienia i grypy.

Dawkowanie - Grypolek, tabletki powlekane, 12 tabletek

Doustnie. Zazwyczaj stosowana dawka leku Grypolek to:

dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 2 tabletki co 6 do 8 godzin, nie więcej niż 8 tabletek na dobę, lub wg przepisu lekarza.

dzieci od 6 do 12 lat: 1 tabletki co 6 do 8 godzin, nie więcej niż 4 tabletki na dobę, lub wg przepisu lekarza.

Dorośli nie powinni przyjmować leku przez okres dłuższy niż 10 dni, a dzieci 5 dni.

Składniki - Grypolek, tabletki powlekane, 12 tabletek

1 tabletki zawiera:

325 mg paracetamolu, 200 mg gwafafenezyny, 30 mg pseudoefedryny chlorowodorku i 15 mg dekstrometorfanu bromowodorku.

Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana, karboksymetyloskrobia sodowa, krzemionka koloidalna, magnezu stearynian, Opadry Yellow Y-5-12821, воск Carnauba (E903).

Działania

Grypolek jest to lek złożony z czterech substancji czynnych, stosowany w ogólnych stanach przeziębienia, bólach głowy i mięśni, gorączce, bólach gardła, nieżytach nosa oraz kaszlu spowodowanym przeziębieniem. Paracetamol wykazuje działanie przeciwo gorączkowe i przeciwbólowe. Chlorowodorek pseudoefedryny obkurcza naczynia krwionośne, a tym samym udrażnia nos i zatoki ułatwiając swobodne oddychanie. Bromowodorek dekstrometorfanu działa skutecznie przeciwkaszlowo, szczególnie w przypadku suchego, drażniącego kaszlu. Gwafafenezyna jest środkiem wykrztusnym, który działa drażniąco na błonę śluzową żołądka i na drodze odruchowej zwiększa wydzielanie gruczołów śluzowych oskrzeli.

Wskazania - Grypolek, tabletki powlekane, 12 tabletek

Stany przeziębienia z bólami głowy, mięśni, gorączką, bólem gardła, nieżytem nosa; kaszel spowodowany przeziębieniem.

Przeciwwskazania - Grypolek, tabletki powlekane, 12 tabletek

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Nadciśnienie tętnicze, choroby serca, cukrzyca, nadczynność tarczycy, zaburzenia w oddawaniu moczu na tle przerostu gruczołu krokowego, jaskra z wąskim kątem przesączania, jednoczesne leczenie inhibitorami MAO (zachować minimum 2 tygodnie odstępu od zaprzestania stosowania) lub lekami przeciwparkinsonowskimi; dzieci poniżej 6 rż., ciężka niewydolność wątroby, choroba alkoholowa; wrodzony niedobór G-6-PD i reduktazy methemoglobinowej. Ostrożnie stosować w ciąży i okresie karmienia; unikać stosowania w I trymestrze ciąży.

Przeciwwskazania - Grypolek, tabletki powlekane, 12 tabletek

Istnieją pojedyncze opisy zmian w obrazie morfologicznym krwi po paracetamolu: trombocytopenii, leukopenii, agranulocytozy oraz skórnych reakcji alergicznych. Sporadycznie mogą wystąpić zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, m.in. ze względu na zawartość gwajakolu - nudności, wymioty, biegunka, pieczenie w nadbrzuszu. Przy nadwrażliwości lub zastosowaniu w dużych dawkach może powodować senność, zawroty głowy, euforię, zaburzenia nastroju.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.