

Grypostop, tabletki powlekane, 12 sztuk



Nasza cena: 7,85 zł

Opis słownikowy

OGRANICZENIE ILOŚCI	KODEINA, PSEUDOEFEDRYNA, DEXTROM
Opakowanie	*12
Postać	Tabletki powlekane
Producent	MEDICOFARMA SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	PARACETAMOLUM, PSEUDOEPHEDRINUM, DEXTROM

Opis produktu

Opis

Dawkowanie - Grypostop, tabletki powlekane, 12 sztuk

Doustnie. Pacjenci powyżej 12 r.ż.: 2 tabl. 3-4 razy na dobę; maksymalnie do 8 tabl. na dobę. Należy zasięgnąć porady lekarza, jeśli kaszel utrzymuje się ponad 7 dni lub gorączka - ponad 3 dni.

Składniki - Grypostop, tabletki powlekane, 12 sztuk

1 tabl. powł. zawiera 325 mg paracetamolu, 30 mg chlorowodoru pseudoefedryny, 15 mg bromowodoru dekstrometorfanu.

Działania

Wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, przeciwkaszlowe i udrożniające przewody nosowe i ujścia zatok obocznych nosa, zmniejsza ilość wydzieliny śluzowej oraz przekrwienie i obrzęk błony śluzowej przewodów nosowych. Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo, głównie poprzez hamowanie aktywności cyklooksygenazy prostaglandynowej w o.u.n. Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, maksymalne stężenie we krwi osiąga po 30-60 min, przenika do płynów ustrojowych i narządów wewnętrznych, w około 25% wiąże się z białkami osocza. $T_{0,5}$ wynosi 3-4 h. Jest metabolizowany w wątrobie, wydalany z moczem w postaci glukuronianów, siarczanów i po sprzężeniu z cysteiną. Chlorowodorek pseudoefedryny obkurcza naczynia krwionośne, zmniejszając przekrwienie błony śluzowej nosa. Jest wydalany z moczem w postaci nie zmienionej. Bromowodorek dekstrometorfanu wykazuje działanie hamujące odruch kaszlu przez bezpośredni wpływ na ośrodek kaszlu w rdzeniu przedłużonym, przez co zmniejsza nasilenie suchego, drażniącego kaszlu. Wchłania się szybko z przewodu pokarmowego. Działanie przeciwkaszlowe występuje po około 30 min po podaniu i utrzymuje się przez 5-6 h. W dawkach leczniczych lek nie hamuje czynności nabłonka rzęskowego oskrzeli.

Wskazania - Grypostop, tabletki powlekane, 12 sztuk

Doraźne zwalczanie objawów przeziębienia, grypy, stanów grypopodobnych (gorączka, katar, kaszel, ból głowy, ból gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe)

Przeciwwskazania - Grypostop, tabletki powlekane, 12 sztuk

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Niedokrwistość, ciężka niewydolność wątroby lub nerek, dzieci poniżej 12 r.ż., okres karmienia piersią, jednoczesne leczenie inhibitorami MAO. Wyłącznie na zlecenie lekarza: w zaburzeniach oddychania, rozedmie płuc, astmie, przewlekłym zapaleniu oskrzeli, przerostie prostaty, przy jednoczesnym stosowaniu anksjolityków lub leków przeciwdepresyjnych. W ciąży stosować wyłącznie w sytuacji, gdy korzyść dla matki przewyższa ryzyko dla płodu.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.