

Grypostop, tabletki powlekane, 24 tabletki



Nasza cena: 13,90 zł

Opis słownikowy

OGRANICZENIE ILOŚCI	KODEINA, PSEUDOEFEDRYNA, DEXTROM
Opakowanie	*24
Postać	TABL.POWL.
Producent	MEDICOFARMA SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	PARACETAMOLUM, PSEUDOEPHEDRINUM, DEXTROM

Opis produktu

Opis

Preparat łagodzi objawy przeziębienia i grypy.

Dawkowanie - Grypostop, tabletki powlekane, 24 tabletki

Lek stosuje się doustnie.

Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: 2 tabletki 3 do 4 razy na dobę.

U dzieci w wieku poniżej 12 lat nie stosować bez zaleceń lekarza.

Składniki - Grypostop, tabletki powlekane, 24 tabletki

1 tabletki powlekana zawiera 325 mg paracetamolu, 30 mg pseudoefedryny chlorowodoru i 15 mg dekstrometofanu bromowodoru. Substancje pomocnicze: magnezu stearynian, celuloza mikrokrystaliczna, powidon, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), skrobia ziemniaczana, hydroksypropylometyloceluloza, glikol polietylenowy, polisorbata 80, tytanu dwutlenek.

Działania

Lek wieloskładnikowy o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym, przeciwkaszlowym, udrażniającym przewody nosowe i ujścia zatok obocznych nosa zmniejszającym ilość wydzieliny śluzowej oraz przekrwienie i obrzęk śluzówki przewodów nosowych.

Wskazania - Grypostop, tabletki powlekane, 24 tabletki

Doraźne leczenie objawów przeziębienia, grypy, stanów grypopochodnych (gorączka, katar, kaszel, ból głowy, ból gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe).

Przeciwwskazania - Grypostop, tabletki powlekane, 24 tabletki

- nadwrażliwość na składniki preparatu,
- ciężka niewydolność wątroby lub nerek,
- niedokrwistość,
- stosowanie jednocześnie leków zawierających paracetamol, pseudoefedrynę, dekstrometorfan,
- stosowanie jednocześnie inhibitorów MAO,
- dzieci do lat 12,
- ciąża i okres karmienia piersią,
- kaszel z dużą ilością wydzieliny,
- astma oskrzelowa,
- ciężkie nadciśnienie,
- ciężka choroba niedokrwienności serca,
- mukowiscydoza.

Przeciwwskazania - Grypostop, tabletki powlekane, 24 tabletki

Zaburzenia rytmu serca, zmiany w morfologii krwi, senność, zawroty głowy, euforia, nadmierne uspokojenie, uczucie pustki w głowie, niepokój, nerwowość, rozdrażnienie, zaburzenia nastroju, pobudzenie ruchowe, spłycenie oddechu, nudności, wymioty, bóle brzucha, zaparcia, wysypka, świąd, zmiany ciśnienia tętniczego, reakcje alergiczne, podwyższenie enzymów wątrobowych, uszkodzenie wątroby.

Jeżeli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, także niewymienione w ulotce należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.