

Guajavis ,syrop 200g

Nasza cena: 9,48 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	200 g
Postać	SYROP
Producent	Vis Zakłady Chem-Farm.katowice
Rejestracja	Lek bez recepty

Opis produktu

Opis

Preparat wykrztuśny stosowany w leczeniu kaszlu.

Dawkowanie - Guajavis ,syrop 200g

Dzieci od 6 do 12lat- 1 łyżeczka syropu 3-4 razy na dobę, dorośli i dzieci powyżej 12lat- 1 łyżka stołowa syropu 3 do 4 razy na dobę. Syrop zażywać po jedzeniu, popijając małą ilością płynu

Składniki - Guajavis ,syrop 200g

1g syropu zawiera 20mg gwajafenezyny.

5ml (6,25g)syropu zawiera 125mg gwajafenezyny, etylu hydroksybenzoesan, czerwień koszenilową, około 187mg etanolu oraz 0,33 jednostek chlebowych sacharozy (3412,5mg sacharozy)aromat rumowy, wodę oczyszczoną.

Działania

Zwiększa wydzielanie śluzu w oskrzelach oraz zmniejsza i gęstość i lepkość wydzieliny oskrzelowej ułatwiając jej odkrztuszenie.

Wskazania - Guajavis ,syrop 200g

Preparat GuajaVIS syrop zawiera gwajafenezynę, która jest lekiem wykrztuśnym (zwiększa wydzielanie śluzu w oskrzelach oraz zmniejsza gęstość lepkość wydzieliny oskrzelowej, ułatwiając jej odkrztuszenie). GuajaVIS stosuje się w leczeniu kaszlu

Przeciwwskazania - Guajavis ,syrop 200g

Nie należy zażywać leku GujaVIS syrop, jeśli występuje nadwrażliwość na gwajafenezynę lub którykolwiek składnik leku.

Zachować szczególną ostrożność stosując u pacjentów z niewydolnością wątroby, w alkoholizmie, padaczce, uszkodzeniem mózgu, chorobach psychicznych, ponieważ preparat zawiera alkohol. GujaVIA należy stosować ostrożnie u pacjentów z nadciśnieniem, chorobami serca, cukrzycą, chorobami naczyń obwodowych, przerostem gruczołu krokowego i jaskrą. Nie stosować u dzieci poniżej 6 lat. Leku nie należy stosować w astmie oskrzelowej, przewlekłym zapaleniu oskrzeli, rozedmie płuc oraz w przewlekłym kaszlu występującym u palaczy tytoniu. Jeśli kaszel utrzymuje się przez dłużej niż tydzień, powraca lub towarzyszy mu gorączka, wysypka, przewlekły ból głowy należy zaprzestać stosowania preparatu i zasięgnąć porady lekarza gdyż taki kaszel może być objawem poważnych schorzeń.

Ze względu na zawartość cukru należy zachować ostrożność u chorych na cukrzycę, u osób z glukozo-galaktozowym zespołem złego wchłaniania, w nietolerancji fruktozy lub u osób z niedoborem sacharazo-izomaltazy.

Gwajafenezyna nie należy podawać jednocześnie z dekstrometorfanem u pacjentów przyjmujących inhibitory monoaminoooksydazy. Gwajafenezyna i (lub) jej metabolity mogą wpływać na wynik oznaczeń kwasu 5-hydroksy-indoloocetowego oraz kwasu wanilinomigdałowego, nie powodując jednak fałszywych, pozytywnych wyników u osób zdrowych.

Leku nie należy stosować w czasie ciąży i karmienia piersią gdyż zawiera alkohol.

Przeciwwskazania - Gujavis ,syrop 200g

Bardzo rzadko może powodować uczucie dyskomfortu w żołądku, nudności, biegunki, zawroty głowy, bóle głowy, wymioty, wysypkę skórą, pokrzywkę.

W przypadku wystąpienia wymienionych działań niepożądanych należy odstawić lek i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Uwagi

Prowadzenie pojazdów:

15ml (łyżka stołowa) syropu, pojedyncza dawka dla dorosłych zawiera około 562mg etanolu. Stosowanie leku osłabia zdolność kierowania pojazdami mechanicznym, obsługi maszyn będących w ruchu, a także zmniejsza sprawność psychoruchową.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.