

## Gynoxin Optima krem 30 g 2%

Nasza cena: 33,43 zł



### Opis słownikowy

Dawka	2%
Opakowanie	30 g
Postać	KREM DOPOCHW.
Producent	RECORDATI SP.A WŁOCHY [IT]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	FENTICONAZOLUM

### Opis produktu

#### Opis

Gynoxin to **krem dopochwowy na infekcje intymne bez recepty**. Nie tylko usuwa objawy zakażenia, ale też działa na bezpośrednią przyczynę infekcji.

Gynoxin to **jedyny krem dopochwowy na rynku, zawierający fentikonazol**. Jest to substancja o szerokim zakresie działania przeciwgrzybiczego.

- **Wybierz lek i wylecz infekcję intymną w 3 dni!**
- **Wysoka skuteczność potwierdzona w licznych badaniach klinicznych.<sup>2</sup>**
- **W odpowiednich przypadkach może być zastosowany również u partnera seksualnego** – komplementarne leczenie kobiet i mężczyzn zmniejsza ryzyko nawrotu infekcji.<sup>3</sup>
- **Teraz dostępny bez recepty!**

Krem dopochwowy Gynoxin wskazany jest do stosowania przy drożdżycy błon śluzowych narządów płciowych (zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy).

Lek na infekcje intymne Gynoxin® można zastosować, jeśli kobieta skarży się na:

- silny, dokuczliwy świąd okolic intymnych;
- ból podczas stosunku i przy oddawaniu moczu;
- upławy grudkowate, serowate, bezzapachowe.

**Co zawiera lek na infekcje intymne Gynoxin krem dopochwowy 20 mg/g– skład:**

Substancją czynną leku Gynoxin® jest fentikonazol. 100 g kremu dopochwowego zawiera 2 g azotanu fentikonazolu (*Fenticonazoli nitras*).

Substancje pomocnicze to: estry makrogolu z kwasami tłuszczowymi (C12-C18), olej migdałowy pierwszego tłoczenia, glikol propylenowy, alkohol cetylowy, glicerolu monostearnian, lanolina uwodorniona, sody edetynian i woda oczyszczona.

Postać farmaceutyczna: krem dopochwowy

## Dawkowanie - jak stosować krem dopochwowy Gynoxin ?

Krem należy stosować za pomocą aplikatora (po umyciu nadaje się do wielokrotnego użytku).

Wprowadzić zawartość aplikatora (ok. 5 g) głęboko do pochwy.

### Stosować:

- 2 razy na dobę – wieczorem przed snem i rano – przez 3 kolejne dni

lub

- 1 raz na dobę - wieczorem przed snem – przez 6 kolejnych dni.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W odpowiednich przypadkach, możliwe jest zastosowanie kremu u partnera seksualnego. Leczenie partnerów kobiet cierpiących na nawracające infekcje drożdżakowe, likwiduje jedną z przyczyn nawrotów zakażenia.

Lek na grzybicze infekcje intymne Gynoxin przeznaczony jest do stosowania u dorosłych i młodzieży powyżej 16-ego roku życia. Pacjenci w wieku powyżej 60-ego roku życia powinni przed zastosowaniem skonsultować się z lekarzem.

### Przeciwwskazania:

- przy nadwrażliwości na fentikonazol lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

### Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Leku Gynoxin w postaci kremu dopochwowego nie należy stosować jednocześnie z mechanicznymi środkami antykoncepcyjnymi. Lek zawiera tłuszcze i oleje, które mogą powodować uszkodzenie mechanicznych środków antykoncepcyjnych wykonanych z lateksu (prezerwatywy, krążki dopochwowe).

Stosowanie produktu leczniczego Gynoxin należy omówić z lekarzem, jeżeli:

- pacjentka jest w wieku powyżej 60 lat,
- do zakażenia doszło po raz pierwszy,
- pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią,
- jednocześnie stosowane są mechaniczne środki antykoncepcyjne wykonane z lateksu. W czasie stosowania tego leku zaleca się stosowanie alternatywnych metod antykoncepcji,
- wystąpią reakcje nadwrażliwości na lek,
- objawy nie zmniejszą się w ciągu 7 dni lub się nasilą,
- u pacjentki wystąpiły co najmniej 4 zakażenia w ciągu ostatniego roku,
- pacjentka lub jej partner przechodzili kiedykolwiek chorobę przenoszoną drogą płciową,
- pacjentka ma uczulenie na imidazol lub inne leki dopochwowe przeciwgrzybicze,
- u pacjentki wystąpił którykolwiek z poniższych objawów:

- nieprawidłowe lub nieregularne krwawienia,
- upławy zabarwione krwią,
- krwawienia z pochwy i/lub ból w ramionach,
- rany pochwy i sromu w tym owrzodzenia i pęcherze,
- ból w dolnej części brzucha, ból pleców oraz ból przy oddawaniu moczu,
- gorączka ( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ),
- cuchnące upławy,
- nudności,
- działania niepożądane takie jak podrażnienie, zaczerwienienie, obrzęk, świąd, wysypka, które są związane z leczeniem.

### Gynoxin w ciąży i w czasie karmienia piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, należy poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Nie stosować leku Gynoxin® u kobiet w ciąży lub karmiących piersią, chyba że lekarz zdecyduje inaczej.

Nie stosować leku Gynoxin u kobiet w wieku rozrodczym, które nie stosują środków antykoncepcyjnych.

### Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Gynoxin® nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

### Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas wprowadzania kremu do pochwy, może wystąpić łagodne, przemijające uczucie pieczenia.

Jeśli lek Gynoxin jest stosowany zgodnie z zaleceniami, substancja czynna słabo się wchłania i występowanie ogólnoustrojowych działań niepożądanych jest mało prawdopodobne.

Bardzo rzadko występujące objawy niepożądane (rzadziej niż u 1 osoby na 10 000):

- odczuwanie pieczenia sromu i pochwy,
- rumień,
- świąd,
- wysypka.

## Przechowywanie

- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Okres ważności: 3 lat

Klauzula, jeśli apteka nie dodaje jej automatycznie:

*Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.*

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**