

# Gynoxin Uno (IMP.ROW.FRANCJA) 600mg 1 kapsułka

Nasza cena: 23,20 zł

## Opis słownikowy

Dawka	600 MG
Opakowanie	*1
Postać	KAPS.
Producent	DELFARMA SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	FENTICONAZOLUM

## Opis produktu

### Opis

## Gynoxin Uno (IMP.ROW.FRANCJA) 600mg 1 kapsułka

Gynoxin UNO jest lekiem bez recepty, usuwa objawy i leczy grzybiczą oraz mieszaną infekcję intymną już 1 kapsułką dopochwową.

Gynoxin UNO działa w miejscu podania, a stężenie terapeutyczne substancji czynnej (azotanu fentikonazolu) utrzymuje się jeszcze przez 3 doby po aplikacji leku.

## Wskazania

Drożdżycza błon śluzowych narządów płciowych (zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy). Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Gynoxin Uno przeznaczony jest do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 16 lat. U kobiet w wieku powyżej 60 lat, Gynoxin Uno można stosować po konsultacji z lekarzem.

## Stosowanie

Kapsułki dopochwowe leku Gynoxin Uno są przeznaczone wyłącznie do stosowania dopochwowego. Nie należy przyjmować kapsułek dopochwowych doustnie.

## Dawkowanie

Dorośli i młodzież powyżej 16 lat: U pacjentek powyżej 60 lat nie stosować bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.- 1 kapsułka dopochwowa, miękka, stosowana jeden raz. Włożyć głęboko do pochwy wieczorem przed snem. Jeśli objawy utrzymują się, następną dawkę można powtórzyć po trzech dniach. Jeśli po upływie 7 dnie nastąpiła poprawa lub pacjentka czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem

## Składniki

1 kapsułka dopochwowa, miękka zawiera 600 mg azotanu fentikonazolu (Fenticonazoli nitras).

## Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**