

Hasceral, maść, 50 g, w tubie



Nasza cena: 20,20 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	50 g
Postać	MASC
Producent	HASCO-LEK, WROCŁAW POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	UREA, ACIDUM SALICYLICUM

Opis produktu

Opis

Preparat polecany w chorobach przebiegających z zaburzeniami rogowacenia naskórka.

Dawkowanie - Hasceral, maść, 50 g, w tubie

Maść wcierać w miejsca zmienione chorobowo 1 do 2 razy na dobę. Stosowany przez kilka lub kilkanaście dni, przy dłuższym stosowaniu wprowadzić dzień przerwy.

Składniki - Hasceral, maść, 50 g, w tubie

1 g maści zawiera mocznik 100 mg oraz kwas salicylowy 50 mg i substancje pomocnicze: polisorbat 40, sorbitanu trójoleinian, Simulsol 165, glicerol, wazelina biała.

Działania

Mocznik wywołuje efekt keratolityczny. Wpływa na rozmiękczenie nadmiernie zrogowaciałych warstw naskórka, a także odnawia płaszcz ochronny skóry, co w znacznym stopniu ogranicza zwrotną utratę wody przez powłoki skórne. Kwas salicylowy wywołuje złuszczenie naskórka. Redukuje przyleganie komórek przez rozpuszczenie substancji międzykomórkowej oraz na zmniejszenie pH warstwy rogowej, co sprzyja nawodnieniu i zmiękczeniu naskórka. Kwas salicylowy i mocznik poprzez zmianę pH na powierzchni skóry działają przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo.

Wskazania - Hasceral, maść, 50 g, w tubie

Choroby przebiegające z zaburzeniami rogowacenia naskórka, takie jak: rybia łuska, łuszczyca, łupież czerwony mieszkowy, nadmierne rogowacenie dłoni i stop, rogowacenie mieszkowe oraz alergiczny i niealergiczny wyprysk dłoni, neurodermit, atopowe zapalenie skóry

oraz nadmierne wysuszenie skóry o różnej etiologii.

Przeciwwskazania - Hasceral, maść, 50 g, w tubie

- nadwrażliwość na składniki preparatu,
- nie stosować na uszkodzoną skórę oraz w okolicy oczu i błon śluzowych,
- nie stosować na większe powierzchnie skóry, a jedynie miejscowo.

Przeciwwskazania - Hasceral, maść, 50 g, w tubie

Niekiedy może dojść do miejscowego podrażnienia skóry.

Uwagi

Przed zastosowaniem w ciąży i okresie karmienia piersią należy poradzić się lekarza.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.