

## Hascosept, płyn, 100 g



Nasza cena: 17,82 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	100g
Postać	PLYN
Producent	HASCO-LEK, WROCŁAW POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	BENZYDAMINUM

### Opis produktu

#### Opis

Płyn do stosowania w jamie ustnej, stosowany miejscowo działa znieczulająco i odkażająco.

#### Dawkowanie - Hascosept, płyn, 100 g

Płukać 2-3 razy dziennie jamę ustną i gardło stosując 15 ml (łyżkę stołową) stężonego płynu lub rozcieńczonego niewielką ilością wody.

#### Składniki - Hascosept, płyn, 100 g

Benzydaminu hydrochlorici 0,15 g Substancje pomocnicze: Błękit patentowy E 131, żółcień cjinolinowa E 104, aromat miętowy, glicerol, etanol 96%, sacharyna, sodu wodorowęglan, metylu parahydroksybenzoesan, polisorbitat 20, woda oczyszczona.

#### Działania

Chlorowodorek benzydaminu jest substancją o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym. Stosowany miejscowo działa znieczulająco i odkażająco.

#### Wskazania - Hascosept, płyn, 100 g

Stany zapalne błony śluzowej jamy ustnej i gardła. Zapalenie dziąseł, języka, aftozy przewlekłe i nawrotowe, choroby przyzębia, paradontoz. Leczenie wspomagające w stomatologii zachowawczej i chirurgii stomatologicznej, stany zapalne górnych dróg oddechowych: angina, zapalenie gardła, krtań i migdałków. Stany pourazowe oraz leczenie wspomagające po radio- i chemioterapii.

#### Przeciwwskazania - Hascosept, płyn, 100 g

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku.

### Przeciwwskazania - Hascosept, płyn, 100 g

Miejscowe działania niepożądane są zazwyczaj przemijające, ustępują samoistnie i rzadko wymagają dodatkowego leczenia. Benzydamina stosowana miejscowo wchłania się w niewielkiej ilości do krążenia, w związku z tym ogólne działania niepożądane występują bardzo rzadko.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko:

- zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: uczucie pieczenia błony śluzowej jamy ustnej,
- zaburzenia żołądka i jelit: suchość w jamie ustnej, nudności oraz wymioty,
- zaburzenia układu immunologicznego: reakcje nadwrażliwości
- zaburzenia układu nerwowego: zaburzenia czucia, drętwienie, zawroty głowy, bóle głowy
- zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wysypka.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**