

Helicid Control 10 mg 14 kapsułek



Nasza cena: 10,10 zł

Opis słownikowy

Dawka	10MG
Opakowanie	*14
Postać	KAPS.
Producent	LECIVA PRAGA CZECHY [CZ]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	OMEPRAZOLUM

Opis produktu

Opis

Helicid Control 10 mg, 14 kapsułek

Substancją czynną preparatu **Helicid Control** jest omeprazol. W ten sposób zmniejsza się kwasowość (zwiększa się pH) soku żołądkowego. Stopień zahamowania zależy od dawki i dotyczy zarówno podstawowego jak i stymulowanego wydzielania kwasu solnego.

Omeprazol jest wrażliwy na działanie kwasu w soku żołądkowym w związku z czym jest stosowany doustnie w postaciach dojelitowych. Po podaniu doustnym szybko wchłania się z jelita cienkiego, stężenie maksymalne we krwi uzyskiwane jest po około 1–2 godzinach. Pokarm nie wpływa na dostępność biologiczną omeprazolu. Po podaniu pojedynczej dawki zmniejszenie wydzielania kwasu żołądkowego utrzymuje się przez całą dobę. Omeprazol metabolizowany jest w wątrobie z udziałem układu enzymatycznego cytochromu P450, metabolity w większości wydalane są z moczem, częściowo także z żółcią.

Wskazania:

Preparat jest wskazany u dorosłych:

- w leczeniu choroby wrzodowej dwunastnicy
- w zapobieganiu nawrotom choroby wrzodowej dwunastnicy
- w leczeniu choroby wrzodowej żołądka
- w zapobieganiu nawrotom choroby wrzodowej żołądka
- w celu eradykacji *Helicobacter pylori* (*H. pylori*) w skojarzeniu z odpowiednimi antybiotykami w chorobie wrzodowej
- w leczeniu owrzodzeń żołądka i dwunastnicy spowodowanych stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ)
- w zapobieganiu owrzodzeniom żołądka i dwunastnicy związanym ze stosowaniem NLPZ u pacjentów narażonych na ryzyko ich wystąpienia
- w leczeniu refluksowego zapalenia przełyku

- w długotrwałym leczeniu podtrzymującym po ustąpieniu refluksowego zapalenia przełyku
- w leczeniu objawowej choroby refluksowej przełyku
- w leczeniu zespołu Zollingera-Ellisona.

Preparat jest wskazany u dzieci po 1. roku życia i o masie ciała co najmniej 10 kg:

- w leczeniu refluksowego zapalenia przełyku
- w leczeniu objawowym zgagi i zarzucania kwaśnej treści żołądkowej w przebiegu choroby refluksowej przełyku.

Preparat jest wskazany u młodzieży i dzieci po 4. roku życia:

- w skojarzeniu z antybiotykami w leczeniu choroby wrzodowej dwunastnicy wywołanej przez H. pylori.

Sposób użycia:

Preparat ma postać kapsułek. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.