

Hemkortin-hc czopki x 12

Nasza cena: 37,42 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	*12
Postać	CZOPKI
Producent	TECHNILAB INC.MONTREAL KANADA [CA]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	HYDROCORTISONUM, ZINCI SULFAS

Opis produktu

Opis

Czopki Hemkortin-hc są wskazane:

- w leczeniu hemoroidów zewnętrznych i wewnętrznych,
- w przewlekłych i ostrych stanach zapalnych odbytu,
- szczelinie odbytu (fissura ani)
- świądzie odbytu.

Mogą być stosowane w okresie przed- i pooperacyjnym.

Skład:

1 czopek zawiera:

Substancje czynne:

10 mg octanu hydrokortyzonu
10 mg jednowodnego siarczanu cynku

Substancja pomocnicza:

Witespol

Dawkowanie:

Hemkortin-hc czopki - należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

U dorosłych zwykle stosuje się jeden czopek rano, jeden wieczorem oraz po każdym wypróżnieniu. Stosować przez trzy do czterech dni, do ustąpienia stanu zapalnego.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Hemkortin-HC jest za mocne lub za słabe lub w przypadku braku skuteczności, należy zwrócić się do lekarza.

Stosowanie leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat jest przeciwwskazane.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku Hemkortin-HC, jeśli:

- pacjent jest uczulony na składniki leku;
- u pacjenta stwierdzono cukrzycę, gruźlicę, jaskrę, osteoporozę, ostrą psychozę, zakażenie grzybicze i wirusowe lub w zakrzepicę żylną.

Zachować szczególną ostrożność stosując Hemkortin-HC, jeśli:

- występuje równocześnie zakażenie, alergia lub inne objawy - należy wówczas stosować odpowiednie leczenie przyczynowe;
- pacjent znajduje się w okresie szczepień lub leczenia immunizacyjnego – nie należy wówczas stosować leku;
- wystąpią objawy podrażnienia – należy wówczas zaprzestać stosowania leku;
- lek jest stosowany długotrwale – istnieje wówczas niewielkie prawdopodobieństwo wystąpienia zmian ogólnoustrojowych, charakterystycznych dla kortykosteroidów;
- wystąpi krwawienie z odbytu – należy wówczas niezwłocznie zwrócić się do lekarza;
- pacjent wcześniej stosował hydrokortyzon – powinien powiedzieć o tym lekarzowi.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Stosowanie u dzieci:

Stosowanie leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat jest przeciwwskazane.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.