

# Heparin Hasco Forte, żel, 35g

Nasza cena: 24,51 zł



## Opis słownikowy

Opakowanie	35 g
Postać	ZEL
Producent	HASCO-LEK, WROCŁAW POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	HEPARINUM

## Opis produktu

### Opis

Lek HEPARIN-HASCO forte wskazany jest w leczeniu wspomagającym chorób żył powierzchniowych.

O tym jak prawidłowo zadbać o swoje nogi dowiedzą się Państwo z artykułu "Problem z nóg - problem z głowy".

### Dawkowanie - Heparin Hasco Forte, żel, 35g

Lek przeznaczony jest do użytku zewnętrznego.

Zaleca się równomierne rozprowadzenie cienkiej warstwy żelu (3 cm do 10 cm) na zmienionym chorobowo miejscu, 2 do 3 razy na dobę.

### Składniki - Heparin Hasco Forte, żel, 35g

1 g żelu zawiera heparyna sodowa 1000 j.m.

Substancje pomocnicze: karbomer 5984, sodu wodorotlenek 30%, glikol propylenowy, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, disodu edetynian, Polisorbat 20, aromat różany AR0287, woda oczyszczona.

### Działania

Lek HEPARIN-HASCO forte przeznaczony jest do stosowania zewnętrznego na skórę. Heparyna stosowana miejscowo działa przeciwzakrzepowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo.

### Wskazania - Heparin Hasco Forte, żel, 35g

Lek HEPARIN-HASCO forte wskazany jest w leczeniu wspomagającym chorób żył powierzchniowych:

- zapalenie żył,

- zakrzepowe zapalenie żył,
- żylaki kończyn dolnych,
- obrzękach, stłuczeniach, krwiakach podskórnych.

### **Przeciwwskazania - Heparin Hasco Forte, żel, 35g**

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Łatwo krwawiące zmiany skórne. Otwarte i sączące rany. Błony śluzowe i okolice oczu.

### **Przeciwwskazania - Heparin Hasco Forte, żel, 35g**

Skórne reakcje alergiczne (w tym zaczerwienienie, świąd, wysypka, pieczenie, rumień).

### **Uwagi**

Leki przeciwzakrzepowe podawane ogólnie lub u pacjentów ze skazą krwotoczną mogą nasilać działanie przeciwzakrzepowe preparatu. Wskazane jest kontrolowanie parametrów krzepnięcia krwi oraz wyglądu skóry.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**