

Heparinum GSK, 300 j., krem, 20g



Nasza cena: 22,66 zł

Opis słownikowy

| | |
|-------------|------------------------------|
| Dawka | 30.000 J |
| Opakowanie | 20 g |
| Postać | KREM |
| Producent | Glaxo Smith Kline Pharm.s.a. |
| Rejestracja | Lek bez recepty |

Opis produktu

Opis

Heparinum GSK, 300 j., krem, 20g

Preparat stosowany w zakrzepowym zapaleniu żył powierzchownych, stanach zapalnych żyłaków, zapaleniu skóry związanym z zakrzepowym zapaleniem żył, stłuczeniach i wylewach krwawych, zapaleniu zakrzepowym guzków krwawniczych (hemoroidów).

Dawkowanie - Heparinum GSK, 300 j., krem, 20g

Równomiernie rozprowadzić cienką warstwę kremu (pasek 3 do 10cm) na zmienione chorobowo miejsca 1 do 3 razy na dobę. W przypadku leczenia żył powierzchniowych okres leczenia wynosi 1 do 2 tygodni, a w przypadku ostrego obrzęków po tępych urazach zaleca się stosowanie produktu leczniczego przez okres do 10dni.

Składniki - Heparinum GSK, 300 j., krem, 20g

1g kremu zawiera:

Substancja czynna: heparyna sodowa 300j.m

Substancje pomocnicze: glicerolu monostearnian, polisorbat 60, sorbitanu stearynian, alkohol cetostearylowy, alkohol benzylowy, parafina ciekła, kwas cytrynowy bezwodny, woda oczyszczona.

Działania

Miejscowe działanie przeciwzakrzepowe i przeciwzapalne. Przyspiesza wchłanianie krwiaków śródskórnych oraz obrzęków. Odgrywa ważną rolę w likwidowaniu miejscowych procesów zapalnych. Łagodzi ból i przyczynia się do szybszego ustąpienia obrzęku zapalnego.

Wskazania - Heparinum GSK, 300 j., krem, 20g

- zapalenie żył, zakrzepowe zapalenie żył, żylaki kończyn dolnych
- obrzęki, stłuczenia, krwiaki podskórne

Przeciwwskazania - Heparinum GSK, 300 j., krem, 20g

Nadwrażliwość na lek przejawiająca się: wysypką, rumieniem, świądem, pieczeniem, suchością skóry itp. w miejscu stosowania. Ze względu na zawartość alkoholu nie należy nakładać na otwarte rany ani błony śluzowe i w okolicach oczu. Nie należy stosować kremu na zmiany skórne o nie ustalonej diagnozie ani w miejscach nadkażonych.

Przeciwwskazania - Heparinum GSK, 300 j., krem, 20g

Rzadko zwłaszcza po długotrwałym stosowaniu kremu zawierającego heparynę, mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości na heparynę objawiające się wysypką, zaczerwienieniem, świądem, suchością lub pieczeniem. U niektórych pacjentów, u których pierwotnie występuje czerwienica prawdziwa po podaniu miejscowym mogą pojawić się zmiany skórne grudkowo-plamkowe, nacieczone krwotocznie, wyprysk skórny ze stwierdzonym w badaniu histopatologicznym leukocytologicznym zapaleniem naczyń krwionośnych.

Uwagi

O tym jak prawidłowo zadbać o swoje nogi dowiedzą się Państwo z artykułu "Problem z nóg - problem z głowy".

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.