Hepatosan Fix, 2g, 20 sztuk

Nasza cena: 9,10 zł

Opis słownikowy

Dawka	2G
Opakowanie	*20
Producent	HERBAPOL-LUBLIN POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	PRODUCTUM HERBARUM

Opis produktu

Opis

Hepatosan Fix, 2g, 20 sztuk

Napar z mieszanki stosuje się w niestrawności i jako środek zwiększający wydzielanie żółci.

Dawkowanie - Hepatosan Fix, 2g, 20 szt.

2 saszetki ziół zalać 1 szklanką wrzącej wody, naparzać przez około 15 minut i przecedzić. Pić 3 razy dziennie pomiędzy posiłkami po 1 szklance naparu. Stosować zawsze świeży napar.

Wskazania - Hepatosan Fix, 2g, 20 szt.

Tradycyjnie w niestrawności i niedostatecznym wydzielaniu żółci. Produkt leczniczy stosuje się w przypadku dolegliwości przy prawidłowym stolcu.

Przeciwwskazania - Hepatosan Fix, 2g, 20 szt.

Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. Niedrożność dróg żółciowych kamica pęcherzyka żółciowego, niedrożność jelit. Ból brzucha o nieustalonej przyczynie. Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Ze względu na zawartość składników goryczkowych w zielu i korzeniu mniszka, mogą pojawić się dolegliwości żołądkowe związane z nadkwaśnością (zgaga, wzdęcia i ból brzucha). Ze względu na zawartość ziela dziurawca u osób szczególnie wrażliwych może wystąpić uczulenie na światło charakteryzujące się wystąpieniem zmian skórnych (rumień, wysypka).

Uwagi

W przypadku nieustąpienia objawów w ciągu 2-3 dni od momentu rozpoczęcia stosowania produktu leczniczego lub ich nasilenia się należy skonsultować się z lekarzem. Ze względu na zawartość ziela krwawnika w składzie leku, spożywanie dawek większych niż zalecane może wpływać na jednocześnie prowadzoną terapię lekami przeciwzakrzepowymi oraz stosowanymi w niedociśnieniu lub nadciśnieniu tętniczym. Ze względu na obecność mentolu, produkt leczniczy powinien być ostrożnie stosowany u osób z chorobą refluksową z powodu możliwości nasilenia się objawów. Ze względu na zawartość ziela dziurawca u osób nadwrażliwych może wystąpić działanie fotouczulające. U osób o jasnej karnacji skóry podczas stosowania leku nie zaleca się ekspozycji na światło słoneczne i promieniowanie UV (solarium).

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.