

Herpex 50mg/g, krem 2 g



Nasza cena: 12,72 zł

Opis słownikowy

Dawka	50MG/G
Opakowanie	2g
Postać	KREM
Producent	SANDOZ GMBH NIEMCY [DE]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	ACICLOVIRUM

Opis produktu

Opis

Lek Herpex ma postać kremu, zawiera substancję czynną acyklowir- lek przeciwwirusowy do stosowania miejscowego. Acyklowir działa silnie na wirusy opryszczki typu 1 i 2, oraz na wirusy ospy wietrznej i półpaśca.

Lek Herpex stosowany miejscowo na niewielkiej powierzchni skóry nie ma działania ogólnoustrojowego.

Dawkowanie - Herpex 50mg/g, krem 2 g

Lek Herpex należy nakładać cienką warstwą na zakażoną powierzchnię skóry 5 razy dziennie co 4 godziny (z przerwą nocną). Lek stosuje się zwykle przez 5 dni.

Składniki - Herpex 50mg/g, krem 2 g

1 g kremu zawiera:

substancję czynną: 50 mg acyklowiru;

substancje pomocnicze: makroglicerydów stearyniany, dimetykon 350, alkohol cetylowy, wazelinę białą, parafinę ciekłą, glikol propylenowy, wodę oczyszczoną.

Działania

Lek przeciwwirusowy, syntetyczny analog nukleozydu purynowego, o działaniu na wirusa opryszczki Herpes simplex (HSV) typu 1 i 2 oraz wirusa Varicella zoster (VZV). Metabolit (trifosforan) acyklowiru stanowi substrat dla wirusowej polimerazy DNA, jest przez nią wbudowywany w DNA wirusa, hamuje jego replikację i w konsekwencji powoduje przerwanie syntezy łańcucha DNA oraz zahamowanie replikacji wirusa.

Wskazania - Herpex 50mg/g, krem 2 g

Herpex stosuje się miejscowo w leczeniu zakażeń skóry (opryszczki warg i narządów płciowych), wywołanych przez wirus opryszczki zwykłej Herpes simplex typu 1 i 2.

Przeciwwskazania - Herpex 50mg/g, krem 2 g

Nadwrażliwość na acyklowir, walacyklowir lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

Niezbyt częste: przemijające uczucie pieczenia lub mrowienia, świąd. Rzadkie: rumień, kontaktowe zapalenie skóry (testy wrażliwości wykazały, że częściej wywołane przez składniki podłoża kremu niż acyklowir).

Uwagi

Leku nie należy stosować na błony śluzowe (np. jamy ustnej, pochwy) ze względu na możliwość podrażnienia. Należy unikać kontaktu preparatu z oczami. Ze względu na zawartość glikolu propylenowego preparat może podrażniać skórę. Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami układu odpornościowego (np. pacjenci z AIDS lub po przeszczepieniu szpiku kostnego) przed rozpoczęciem leczenia powinni zasięgnąć porady lekarza. Parafina i wazelina zawarte w preparacie mogą zmniejszyć bezpieczeństwo stosowania prezerwatyw. Stosowanie leku na narządy płciowe i w okolicy odbytu może zmniejszyć wytrzymałość prezerwatywy z lateksu na rozdarcie.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.