

Herpex, krem 50 mg/g, 2 g

Nasza cena: 11,42 zł



Opis słownikowy

Dawka	50MG/G
Opakowanie	2 g
Postać	KREM
Producent	INPHARM SP. Z O. O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	ACICLOVIRUM

Opis produktu

Opis

Herpex to przeciwwirusowy lek w formie kremu przeznaczony do stosowania miejscowego, którego substancją czynną jest acyklowir. Substancja ta wykazuje silne działanie na wirusy opryszczki Herpes simplex (HSV) typu 1 i 2 oraz na wirusy ospy wietrznej i półpaśca Varicella-Zoster (VZV). Lek nie wykazuje działania ogólnoustrojowego, a jedynie miejscowe, na niewielkiej powierzchni skóry w miejscu aplikacji. Można stosować go na zmienioną skórę warg oraz narządów płciowych.

Lek działa na wirusy opryszczki Herpes simplex (HSV) typu 1 i 2 oraz na wirusy ospy wietrznej i półpaśca Varicella-Zoster (VZV).

Wskazania:

Leczenie zakażeń skóry wywołanych wirusami opryszczki zwykłej Herpes simplex typu 1 i 2.

Dawkowanie:

Cienką warstwę kremu należy nałożyć na zakażoną powierzchnię skóry 5 razy dziennie co 4 godziny, zachowując nocną przerwę. Aplikację leku należy wykonać za pomocą pałeczki kosmetycznej na miejsca zmienione i sąsiadującą z nimi powierzchnię skóry. W przypadku nakładania leku bezpośrednio palcami, przed i po jego aplikacji należy dokładnie umyć ręce, w celu uniknięcia zakażenia zmienionej chorobowo skóry lub rozprzestrzenienia się wirusa opryszczki na niezakażoną błonę śluzową i skórę.

Najczęstszym okresem stosowania leku jest 5 dni, jednak nie powinien on przekraczać 10 dni. W przypadku, gdy nie nastąpiło zagojenie zmian skórnych, należy kontynuować leczenie do czasu wygojenia lub utworzenia się strupów. Największą skuteczność lek wykazuje w przypadku stosowania natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów zakażenia wirusem opryszczki, takich jak pieczenie, swędzenie, uczucie napięcia i zaczerwienienia. Stosowanie leku w stadium wyczerpania strupów nie przynosi skuteczności.

Przeciwwskazania:

Leku nie należy stosować, jeżeli pacjent jest uczulony na:

- acyklowir
- walacyklowir
- glikol propylenowy lub którykolwiek z jego pozostałych składników.

Składniki:

1 g kremu zawiera: substancję czynną: acyklowir 50mg, pozostałe składniki: makrogolicerydów stearyniany, dimetykon 350, alkohol cetylowy, wazelina biała, parafina ciekła, glikol propylenowy, woda oczyszczona.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Niezbyt częstymi działaniami niepożądanymi są: przemijające uczucie pieczenia lub kłucia, nieznaczne wysuszenie lub złuszczenie skóry, świąd.

Rzadkimi działaniami niepożądanymi są: rumień i kontaktowe zapalenie skóry.

Bardzo rzadkimi działaniami niepożądanymi są: natychmiastowe reakcje nadwrażliwości, w tym obrzęk naczynioruchowy i pokrzywka.

Interakcje:

Należy poinformować o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, również o tych, które planuje on przyjmować, nawet jeśli są to leki wydawane bez przepisu lekarza. Istotne interakcje z innymi lekami nie są znane.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.