

Hexagyn Duo 2 g, 10 globulek dopochwowych



Nasza cena: 29,92 zł

Opis słownikowy

Dawka	2G
Opakowanie	*10
Postać	GLOB.DOPOCHW.
Producent	Hexanova Sp.z O.o. Polska [PI]
Rejestracja	Wyrób medyczny
Substancja czynna	ACIDUM HYALURONICUM, ACIDUM LACTICUM

Opis produktu

Opis

Hexagyn Duo 2 g, 10 globulek dopochwowych

HEXAGYN DUO to globulki dopochwowe o podwójnej sile działania, które:

- regenerują błonę śluzową pochwy,
- zapobiegają suchości pochwy o charakterze zapalnym i zakaźnym,
- odbudowują prawidłową mikroflorę pochwy,
- przywracają fizjologiczne środowisko pochwy,
- nawilżają i przeciwdziałają suchości okolic intymnych,
- ograniczają infekcje i stany zapalne pochwy.

Regularne stosowanie globulek dopochwowych HEXAGYN DUO pozwala w utrzymaniu naturalnej ochrony pochwy i przyspiesza odbudowę prawidłowej mikroflory pochwy (pałeczek Lactobacillus). Wielkość i kształt globulek zostały opracowane w oparciu o budowę anatomiczną kobiety, dzięki czemu ich stosowanie jest wygodne i komfortowe.

Globulki dopochwowe **HEXAGYN DUO** polecane są zarówno do stosowania profilaktycznego jak również jako uzupełnienie w trakcie leczenia infekcji i stanów zapalnych.

Opakowanie zawiera 10 globulek dopochwowych, nie wymaga przechowywania w lodówce.

Działanie:

Działanie poszczególnych składników globulki dopochwowej HEXAGYN DUO:

Składniki zawarte w globulce HEXAGYN DUO działają synergicznie względem siebie dzięki czemu efekt terapeutyczny jest szybciej odczuwalny.

Kwas hialuronowy w postaci soli sodowej w ilości 10 mg/globulkę ma działanie uwadniające i smarujące w suchości pochwy. Wspomaga i przyspiesza przebieg regeneracji tkanek, nawilża i uelastycznia śluzówkę pochwy.
Kwas mlekowy sprzyja natychmiastowemu skorygowaniu pH do 4,4, co zmniejsza ryzyko wystąpienia infekcji bakteryjnych okolic intymnych.
Polikarbofil – normalizuje i utrzymuje kwaśnię pH pochwy do 72 godzin. Działa nawilżająco i na długo znosi suchość pochwy, dyskomfort okolic intymnych oraz ogranicza rozwój infekcji pochwy.

Jak zaaplikować globulkę dopochwową HEXAGYN DUO?

- Dokładnie umyć ręce.
- Dokładnie umyć okolice pochwy.
- Otworzyć opakowanie i wyjąć jedną globulkę z blistra.
- Delikatnie wprowadzić globulkę głęboko w pochwie, najlepiej w pozycji leżącej na plecach, aby nie dopuścić do -niezamierzonego wysunięcia się globulki.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.