

## Hirudoid, maść, 40 g



Nasza cena: 25,75 zł

### Opis słownikowy

|                   |   |
|-------------------|---|
| Opakowanie        | 40g   |
| Postać            | MASC  |
| Producent         | SANKYO PHARMA /LUITPOLD WERKE/<br>NIEMCY [DE] |
| Rejestracja       | Lek bez recepty                               |
| Substancja czynna | HEPARINOIDUM                                  |

### Opis produktu

#### Opis

### Hirudoid, maść, 40 g

Hirudoid - maść zawierająca pochodną heparyny, do miejscowego stosowania przy problemach z żyłkami nóg.

### Dawkowanie - Hirudoid, maść, 40 g

Preparat jest lekiem do stosowania miejscowego na skórę. Należy nakładać 2 do 3 razy dziennie miejsca zmienione chorobowo, jeżeli zachodzi potrzeba częściej. W zależności od wielkości leczonej powierzchni zwykle wystarcza od 3 do 5 cm maści. W przypadku tępych urazów leczenie trwa zwykle do 10 dni, a w przypadku zapalenia żył powierzchniowych od 1 do 2 tygodni.

### Składniki - Hirudoid, maść, 40 g

Substancją czynną leku jest polisarczan mukopolisacharydowy 0,3 g. Pozostałe składniki to glicerol 85%, 4-hydroksybenzoesan propylu, kwas stearynowy, podłoże maściowe z alkoholami lanoliny, alkohol cetosterylowy emulgujący, alkohol mirystylowy, alkohol izopropylowy, potasu wodorotlenek, tymol, woda oczyszczona.

### Działania

Przeciwzapalne, przeciwzakrzepowe, przyspiesza wchłanianie krwiaków, przeciwobrzękowe.

### Wskazania - Hirudoid, maść, 40 g

Polisarczan mukopolisacharydowy należy do grupy leków stosowanych miejscowo w przypadku:  
- tępych urazów z krwiakami lub bez nich,

- zapalenie żył powierzchniowych, których nie można leczyć opatrunkiem uciskowym.  
Preparat może być także stosowany do fonoforezy i jonoforezy.

### Przeciwwskazania - Hirudoid, maść, 40 g

Nadwrażliwość na składniki preparatu.  
Nie nakładać na otwarte rany i uszkodzoną skórę.

### Przeciwwskazania - Hirudoid, maść, 40 g

Bardzo rzadko mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości, takie jak zaczerwienienie skóry, które zwykle ustępuje szybko po zaprzestaniu stosowania preparatu. 4-hydroksybenzoesan metylu i propylu mogą powodować reakcje alergiczne.

### Uwagi

Lek można stosować w okresie ciąży i karmienia piersią. Przed zastosowaniem należy poradzić się lekarza.

O tym jak prawidłowo zadbać o swoje nogi dowiedzą się Państwo z artykułu "Problem z nóg - problem z głowy".

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**