

Hirudoid, żel 40g (import równoległy)

Nasza cena: 16,28 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	40g
Postać	ZEL
Producent	Inpharm Sp. Z O. O.
Rejestracja	Lek bez recepty

Opis produktu

Opis

Hirudoid - maść zawierająca pochodną heparyny, do miejscowego stosowania przy problemach z żyłkami nóg.

Wskazania:

Polisarczan mukopolisacharydowy należy do grupy leków stosowanych miejscowo w przypadku:

- tępych urazów z krwiakami lub bez nich,
 - zapalenie żył powierzchniowych, których nie można leczyć opatrunkiem uciskowym.
- Preparat może być także stosowany do fon- i jonoforezy.

Działanie:

Przeciwzapalne, przeciwzakrzepowe, przyspiesza wchłanianie krwiaków, przeciwobrzękowe.

Działanie nieporządane:

Bardzo rzadko mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości, takie jak zaczerwienienie skóry, które zwykle ustępuje szybko po zaprzestaniu stosowania preparatu. 4-hydroksybenzoesan metylu i propylu mogą powodować reakcje alergiczne.

Dawkowanie:

Preparat jest lekiem do stosowania miejscowego na skórę. Należy nakładać 2 do 3 razy dziennie miejsca zmienione chorobowo, jeżeli zachodzi potrzeba częściej. W zależności od wielkości leczonej powierzchni zwykle wystarcza od 3 do 5 cm maści. W przypadku tępych urazów leczenie trwa zwykle do 10 dni, a w przypadku zapalenia żył powierzchniowych od 1 do 2 tygodni.

Skład:

Substancją czynną leku jest polisiarczan mukopolisacharydowy 0,3 g. Pozostałe składniki to glicerol 85%, 4-hydroksybenzoesan propylu, kwas stearynowy, podłoże maściowe z alkoholami lanoliny, alkohol cetosterylowy emulgujący, alkohol mirystylowy, alkohol izopropylowy, potasu wodorotlenek, tymol, woda oczyszczona.

O tym jak prawidłowo zadbać o swoje nogi dowiedzą się Państwo z artykułu "Problem z nóg - problem z głowy".

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.