

Hitaxa 5 mg 30 tabletek

Nasza cena: 9,43 zł

Opis słownikowy

Dawka	5 MG
Opakowanie	*30
Postać	TABL.ROZP.W USTACH
Producent	ADAMED SP.Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	DESLORATADINUM

Opis produktu

Opis

Wskazania - Hitaxa 5 mg 30 tabletek

Produkt wskazany do stosowania w celu łagodzenia objawów związanych z: alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa, pokrzywką.

Działanie

Desloratadyna jest pozbawionym działania uspokajającego, długo działającym antagonistą histaminy wykazującym selektywną antagonistyczną aktywność wobec obwodowych receptorów H1. Po podaniu doustnym desloratadyna selektywnie hamuje obwodowe receptory histaminowe H1, ponieważ nie przenika do OUN. Badania in vitro wykazały przeciwalergiczne właściwości desloratadyny. Obejmują one hamowanie uwalniania cytokin indukujących reakcję zapalną, takich jak IL-4, IL-6, IL-8 i IL-13, z ludzkich komórek tucznych i granulocytów zasadochłonnych, jak również hamowanie ekspresji adhezyjnej cząsteczki selektyny P na powierzchni komórek śródbłonna. Kliniczne znaczenie tych obserwacji nie zostało jeszcze potwierdzone.

Skład

1 ml roztworu doustnego zawiera 0,5 mg desloratadyny. 1 tabletkę ulegającą rozpadowi w jamie ustnej zawiera 2,5 lub 5 mg desloratadyny.

Przeciwwskazania - Hitaxa 5 mg 30 tabletek

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą lub na loratadynę.

Działania niepożądane

Najczęstsze działania niepożądane: uczucie zmęczenia, suchość w jamie ustnej i bóle głowy.
Lista działań niepożądanych została zawarta w ulotce dołączonej do opakowania.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.