

Hitaxa Fast Kids, roztwór doustny, 60 ml



Nasza cena: 17,23 zł

Opis słownikowy

Dawka	500 MCG/ML
Opakowanie	60 ML (BUT.)
Postać	ROZTW.DOUST.
Producent	ADAMED PHARMA S.A. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	DESLORATADINUM

Opis produktu

OPIS

Hitaxa Fast Kids jest lekiem przeciwalergicznym, który ułatwia kontrolę reakcji alergicznej oraz jej objawów. Ma postać klarownego, bezbarwnego roztworu doustnego o owocowym zapachu.

Lek jest przeznaczony dla dzieci w wieku powyżej 2 lat, młodzieży i dorosłych. Nie wywołuje senności.

SKŁAD

Substancją czynną leku jest *desloratadyna*. Jeden ml roztworu doustnego zawiera 0,5 mg desloratadyny.

Pozostałe składniki leku to: hypromeloza typ 2910, sukraloza (E 955), kwas cytrynowy, bezwodny, sodu cytrynian, sorbitol ciekły, niekryształizujący (E 420), glikol propylenowy (E 1520), aromat Tutti Frutti, płynny (glikol propylenowy, substancje smakowo-zapachowe), woda oczyszczona.

DAWKOWANIE

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i więcej: 10 ml (2 łyżki miarowe o pojemności 5 ml) roztworu doustnego raz na dobę.

Stosowanie u dzieci

W przypadku niedowagi lub nadwagi zaleca się konsultację z lekarzem w celu dostosowania dawki.

Dzieci w wieku powyżej 2 lat do 5 lat: 2,5 ml (pół łyżki miarowej o pojemności 5 ml) roztworu doustnego raz na dobę. U dzieci w wieku od 2 do 5 lat lek Hitaxa Fast Kids może być stosowany wyłącznie po uprzednim zdiagnozowaniu alergii.

Dzieci w wieku od 6 do 11 lat: 5 ml (jedna łyżka miarowa o pojemności 5 ml) roztworu doustnego raz na dobę.

Sposób stosowania: dawkę roztworu doustnego należy połączyć i następnie popić wodą. Lek można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku. Do butelki roztworu doustnego dołączona jest łyżka miarowa, którą można stosować do odmierzania odpowiedniej objętości roztworu doustnego.

Czas trwania leczenia lekiem Hitaxa Fast Kids: jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem. Leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i pokrzywki desloratadyną bez konsultacji lekarskiej nie powinno trwać dłużej niż 10 dni.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Nie należy podawać leku Hitaxa Fast Kids dzieciom w wieku do 2 lat.

WSKAZANIA

Hitaxa Fast Kids łagodzi objawy związane z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (zapalenie błony śluzowej nosa spowodowane uczuleniem, na przykład katarciem siennym lub uczuleniem na roztocza). Do objawów tego stanu zalicza się: kichanie, swędzenie lub wydzielinę z nosa, swędzenie podniebienia oraz swędzenie, zaczerwienienie lub łzawienie oczu.

Lek jest stosowany również w celu łagodzenia objawów związanych z pokrzywką (stan skóry wywołany uczuleniem). Do objawów tego stanu zalicza się świąd skóry i pokrzywkę.

Złagodzenie tych objawów utrzymuje się cały dzień, co ułatwia powrót do codziennych czynności oraz normalnego snu.

PRZECIWWSKAZANIA

Leku Hitaxa Fast Kids nie należy stosować, jeśli pacjent ma uczulenie na desloratadynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, lub na loratadynę.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE / SKUTKI UBOCZNE

Jak każdy lek, Hitaxa Fast Kids może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Po wprowadzeniu leku do obrotu bardzo rzadko zgłaszano przypadki ciężkich reakcji alergicznych (trudności w oddychaniu, świszczący oddech, świąd, pokrzywka i obrzęk). Jeśli wystąpi którekolwiek z tych ciężkich działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast zgłosić się do lekarza.

Wykaz wszystkich możliwych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leku Hitaxa Fast Kids znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.

W badaniach klinicznych u większości dzieci i dorosłych działania niepożądane były prawie takie same, jak po zastosowaniu roztworu lub tabletki, które nie zawierają substancji czynnej. U dorosłych pacjentów uczucie zmęczenia, suchość w jamie ustnej i ból głowy odnotowywane były jednak częściej niż po zastosowaniu tabletki niezawierającej substancji czynnej.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE DZIAŁANIA LEKU

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie leku Hitaxa Fast Kids należy omówić z lekarzem lub farmaceutą, jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek lub drgawki w wywiadzie medycznym lub rodzinnym.

Hitaxa Fast Kids zawiera 150 mg sorbitolu w każdym ml roztworu doustnego. Sorbitol jest źródłem fruktozy. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta dorosłego lub dziecka nietolerancję niektórych cukrów lub dziedziczną nietolerancję fruktozy, rzadką chorobę genetyczną, w której organizm pacjenta nie rozkłada fruktozy, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku lub podaniem go dziecku.

Lek zawiera 150,75 mg glikolu propylenowego w każdym ml roztworu doustnego.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Wszystkie ostrzeżenia dotyczące stosowania leku Hitaxa Fast Kids są zamieszczone w ulotce dołączonej do opakowania.

INTERAKCJE Z INNYMI LEKAMI

Nie są znane interakcje leku Hitaxa Fast Kids z innymi lekami.

CIĄŻA I KARMIENTE PIERSIĄ

Nie zaleca się stosowania leku Hitaxa Fast Kids w czasie ciąży lub karmienia piersią.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak dostępnych danych dotyczących wpływu na płodność mężczyzn i kobiet.

PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGA MASZYN

Nie przypuszcza się, aby lek Hitaxa Fast Kids stosowany w zalecanej dawce wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn. Choć u większości osób nie występuje senność, pacjentowi zaleca się powstrzymanie od wykonywania czynności wymagających koncentracji uwagi, takich jak prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn, do czasu ustalenia, w jaki sposób reaguje na ten lek.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze 15°C - 25°C

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.