

Honikan Gardło 2-fazowe pastylki do ssania, 16 sztuk



Nasza cena: 14,87 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*16
Postać	PASTYLKI D/SSANIA
Producent	USP ZDROWIE SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

Honikan Gardło 2-fazowe pastylki do ssania, 16 sztuk

Honikan Gardło 2-fazowe pastylki do ssania, wskazane są w terapii drażniącego kaszlu, bólu gardła i chrypki (np. przy przeziębieniu) oraz wspomagają naturalne nawilżanie błony śluzowej jamy ustnej i gardła. Produkt przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej 6. roku życia

Preparat zawiera sacharozę i glukozę.

Składniki

Ekstrakt z porostu islandzkiego, ekstrakt z malwy, witamina C, sacharoza, mentol, syrop glukozowo-fruktozowy, aromat wiśniowy, miód Manuka.

Sposób użycia

Przy pierwszych objawach przeziębienia u dorosłych i dzieci powyżej 6. roku życia: stosować po jednej pastylce kilka razy dziennie, w zależności od potrzeb.

Powoli rozpuścić pastylkę w ustach.

Nie należy przekraczać dziennej dawki 6 pastylek.

W przypadku braku poprawy po 7 dniach, należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na preparat lub którykolwiek z jego składników, lub w przypadku podejrzenia nadwrażliwości. Mentol może powodować reakcje nadwrażliwości u osób na niego uczulonych. Osoby, u których występuje alergia na produkty pszczele lub jad pszczoł nie powinny stosować preparatu. Brak jest badań dotyczących stosowania preparatu w ciąży, dlatego Honikan Gardło należy przyjmować wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Preparat zawiera sacharozę i glukozę.

Honikan Gardło należy przyjmować wyłącznie po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą, jeżeli występuje nietolerancja na niektóre substytuty cukru.

Stosowanie z innymi preparatami

Wpływ na skuteczność innych preparatów lub leków nie jest znany w przypadku stosowania Honikan Gardło zgodnie z zaleceniami.

Nie należy jednak zażywać pastylek jednocześnie z innymi preparatami lub lekami (gumami do żucia, pastylkami, płukankami) lub z produktami codziennego użytku (z jedzeniem, napojami, pastą do zębów itp.). Należy zachować odpowiedni odstęp czasu między przyjęciem kolejnych preparatów, co najmniej 30 minut.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

HCE GmbH
Harburger Schloßstraße 14
D-21079 Hamburg
Niemcy

Dystrybutor

USP Zdrowie SP. z o.o.
Ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa
+48 22 5436000

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.