

Hydroxyzine Orion 10 mg 30 tabletek powlekanych

Nasza cena: 10,28 zł

Opis słownikowy

Dawka	10 MG
Opakowanie	*30
Postać	TABL.POWL.
Producent	ORION CORPORATION FINLANDIA [FI]
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	HYDROXYZINUM

Opis produktu

Opis

Hydroxyzine Orion stosuje się w objawowym leczeniu lęku u dorosłych, gdy zastosowanie alternatywnych leków nie jest wskazane. Objawowe leczenie świądu i pokrzywki. Produkt leczniczy Hydroxyzine Orion wskazany jest u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 5 lat i powyżej.

Dawkowanie:

Dawkę produktu leczniczego HydroxyzineOrion należy dostosować indywidualnie do potrzeby pacjenta i stosować produkt w najmniejszej skutecznej dawce, a czas leczenia powinien być możliwie jak najkrótszy.

Świąd i pokrzywka:

Dorośli i młodzież (w wieku ≥ 12 lat, o masie ciała >40 kg):

Dawka początkowa: 25 mg do 50 mg wieczorem.

Dzieci (w wieku ≥ 5 do 11 lat, o masie ciała ≤ 40 kg):

10 mg do 25 mg wieczorem.

Objawowe leczenie lęku u dorosłych:

Dorośli: 10 mg do 50 mg (w dawkach podzielonych na 2 lub 3 dawki dobowe).

Przeciwwskazania:

- Nadwrażliwość na substancję czynną, cetyryzynę lub inne pochodne piperazyny, aminofilinę, etylenodiaminę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
- Porfiria
- Ciąża i karmienie piersią
- Pacjenci ze znanym nabytym lub wrodzonym wydłużeniem odstępu QT.
- Pacjenci ze znanymi czynnikami ryzyka wydłużenia odstępu QT, w tym ze stwierdzoną chorobą układu krążenia, znaczącymi zaburzeniami elektrolitowymi (hipokaliemia, hipomagnezemia), nagłą śmiercią sercową w rodzinie, znaczącą bradykardią, stosujący jednocześnie leki, o których wiadomo, że wydłużają odstępek QT i (lub) wywołują zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes.

Skład:

Każda tabletkowa powlekana zawiera 10 mg hydroksyzyny chlorowodoru

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Tabletki 10 mg Każda 10 mg tabletkowa powlekana zawiera 56 mg laktozy jednowodnej.

Wykaz substancji pomocniczych:

Rdzeń tabletki:

- Laktoza jednowodna
- Wapnia fosforan
- Skrobia żelowana kukurydziana
- Sodu laurylosiarczan
- Krzemionka koloidalna bezwodna
- Magnezu stearynian

Otoczka:

- Tytanu dwutlenek (E 171)
- Hypromeloza 5 mPas
- Makrogol 400

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.