

Hydroxyzinum Espefa 10 mg 30 tabletek powlekanych

Nasza cena: 6,36 zł

Opis słownikowy

Dawka	10MG
Opakowanie	*30
Postać	TABL.POWL.
Producent	ESPEFA S.P.CH-F.KRAKÓW POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	HYDROXYZINUM

Opis produktu

Opis

Wskazania - Hydroxyzinum Espefa 10 mg 30 tabletek powlekanych

Lek jest zalecany do stosowania podczas :
leczenie objawowe lęku , niepokoju u dorosłych nerwice przewlekła pokrzywka

- objawowe leczenie świądu na tle alergicznym
- premedykacja przed zabiegami chirurgicznymi

Dawkowanie - Hydroxyzinum Espefa 10 mg 30 tabletek powlekanych

Stosować według wskazań lekarza prowadzącego.
Lek należy stosować w najmniejszej skutecznej dawce.
Podawać zawsze po posiłku , tabletek nie należy rozgryzać.

Działanie

Hydroksyzyna wykazuje działanie hamujące na czynności ośrodkowego układu nerwowego. Posiada działanie uspakajające i wyciszające., zmniejsza napięcie mięśniowe.
Lek wykazuje również działanie przeciwwymiotne.
Nie wpływa na czynności kory mózgowej.

Skład

1 tabletkę powlekana zawiera 10 mg hydroksyzyny chlorowodoru.

Przeciwwskazania - Hydroxyzinum Espefa 10 mg 30 tabletek powlekanych

Nie należy stosować preparatu u osób wrażliwych na cetyryzynę, pochodne piperazyny, aminofilinę lub etylenodiaminę.
Nie stosować w okresie ciąży oraz karmienia piersią.
Podczas przyjmowania leku nie należy spożywać alkoholu.

Działania niepożądane

Podczas stosowania leku może pojawić się nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
Mogą pojawić się działania niepożądane takie jak :suchość błon śluzowych jamy ustnej, zmęczenie, senność, złe samopoczucie, gorączka, drżenie dłoni.
Skutki uboczne zmniejszają się lub ustępują po kilku dniach leczenia, lub po zmniejszeniu dawki podawanego leku.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.