

Hydroxyzinum VP 10 mg 30 tabletek powlekanych

Nasza cena: 7,38 zł

Opis słownikowy

Dawka	10MG
Opakowanie	*30
Postać	TABL.POWL.
Producent	Pharmaswiss Czechy [Cz]
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	HYDROXYZINUM

Opis produktu

Opis

Wskazania:

- leczenie lęku,
- objawowe leczenie świądu,
- premedykacja przed zabiegami chirurgicznymi.

Dawkowanie:

Produkt powinien być stosowany pod kontrolą lekarza i według jego wskazówek. Należy zauważyć iż dawka leku ustalana jest indywidualnie dla każdego pacjenta.

Leczenie lęku:

- produkt stosuje się doustnie,
- zwyczajowa dawka wynosi 50 mg na dobę w 2-3 dawkach podzielonych,
- w ciężkich przypadkach stosuje się dawki do 300 mg/dobę.

Objawowe leczenie świądu:

- produkt stosowany jest doustnie,

- dawka początkowa wynosi 25 mg przed snem,
- jeżeli istnieje konieczność dawkę można zwiększyć podając 25 mg od 3 do 4 razy na dobę.

Premedykacja przed zabiegami chirurgicznymi:

- zalecana dawka wynosi od 50 do 100 mg w pojedynczej dawce.

Działanie:

- uspokajające,
- przeciwłękowe,
- zmniejsza stan napięcia wewnętrznego,
- zmniejsza uczucie niepokoju, lęku, chwiejność emocjonalną oraz napięcie mięśniowe,
- przeciwhistaminowe,
- przeciwbólowe,
- przeciwwymiotne.

Skład:

1 tabletkę powlekana zawiera 10 mg hydroksyzyny chlorowodoru.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować produktu jeżeli u pacjentów istnieją przeciwwskazania:

- nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,
- porfiria o przewlekłym, zaostrzającym się przebiegu.

Działania niepożądane:

Działania niepożądane jakie mogą występować podczas stosowania produktu to:

- suchość błony śluzowej jamy ustnej,
- nudności,
- wymioty, zaparcia,
- nadmierne pocenie się,
- senność,
- ból i zawroty głowy,
- zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi,
- nadwrażliwość na hydroksyzynę,
- zatrzymanie moczu,

- zaburzenia akomodacji,
- pogorszenie funkcji poznawczych u pacjentów w podeszłym wieku.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.