

# Hydroxyzinum VP 25 mg 30 tabletek powlekanych

Nasza cena: 7,98 zł

## Opis słownikowy

Dawka	25MG
Opakowanie	*30
Postać	TABL.POWL.
Producent	Pharma Swiss Polska [PI]
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	HYDROXYZINUM

## Opis produktu

### Opis

### Wskazania:

#### Lek zaleca się stosować w:

- leczeniu lęku.
- objawowym leczenie świądu,
- jako premedykacja przed zabiegami chirurgicznymi.

### Dawkowanie:

#### Leczenie lęku:

##### Dorośli:

- doustnie, 50 mg na dobę w 2-3 dawkach podzielonych. W ciężkich przypadkach stosuje się dawki do 300 mg na dobę.

#### Objawowe leczenie świądu:

##### Dorośli:

- doustnie, początkowo 25 mg przed snem. W razie potrzeby dawkowanie można zwiększyć podając 25 mg 3-4x/dobę.

##### Dzieci w wieku powyżej 6 lat:

- doustnie, 15-25 mg na dobę, a w razie potrzeby maksymalnie 50-100 mg na dobę, w dawkach podzielonych.

#### **Dzieci w wieku 3-6 lat:**

- doustnie, 5-15 mg/dobę, a w razie potrzeby maksymalnie 50 mg na dobę, w dawkach podzielonych.

#### **Premedykacja przed zabiegami chirurgicznymi:**

##### **Dorośli:**

- doustnie, 50-100 mg w pojedynczej dawce.

##### **Dzieci:**

- doustnie, 0,6 mg na każdy kilogram masy ciała w pojedynczej dawce.

#### **Działanie:**

Hydroksyzyna jest lekiem o działaniu uspokajającym i przeciwłękowym. Mechanizm jej działania nie został w pełni poznany, jednak prawdopodobnie polega na hamowaniu aktywności niektórych podkorowych obszarów OUN. Hydroksyzyna nie wpływa hamująco na czynność kory mózgowej. Zmniejsza stan napięcia wewnętrznego, uczucie niepokoju, lęku, chwiejność emocjonalną oraz napięcie mięśniowe. Wykazuje również właściwości przeciwhistaminowe, przeciwbólowe oraz przeciwwymiotne. Hydroksyzyna nie jest spokrewniona chemicznie z fenotiazyną, rezerpiną, meprobamatem ani benzodiazepinami.

#### **Skład:**

1 tabletkę powlekana zawiera 25 mg hydroksyzyny chlorowodoru.

#### **Przeciwwskazania:**

Nie należy stosować leku jeżeli u pacjenta wystąpiła nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, porfiria o przewlekłym, zaostrzającym się przebiegu.

#### **Działania niepożądane:**

Objawy niepożądane mogące wystąpić w trakcie stosowania chlorowodoru hydroksyzyny są zazwyczaj łagodne i mają charakter przemijający.

- suchość błony śluzowej jamy ustnej,
- nudności,
- wymioty,
- zaparcia,
- nadmierne pocenie się,
- senność,
- ból i zawroty głowy,
- zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi,
- nadwrażliwość na hydroksyzynę,
- zatrzymanie moczu,

- zaburzenia akomodacji,
- pogorszenie funkcji poznawczych u pacjentów w podeszłym wieku.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.