

# Hygroton 50 mg 20 tabletek

Nasza cena: 15,12 zł

## Opis słownikowy

Dawka	50MG
Opakowanie	*20
Postać	Tabletki
Producent	AMDIPHARM IRLANDIA [IE]
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	CHLORTALIDONUM

## Opis produktu

### Opis

### Wskazania:

Lek przepisywany jest w celu leczenia nadciśnienia tętniczego: jako monoterapię lub wspólnie z innymi lekami hipotensyjnymi (np.  $\beta$ -adrenolitykami, lekami rozszerzającymi naczynia, antagonistami wapnia, ACE, rezerpiną). Niewydolność krążenia. Obrzęki: w następstwie niewydolności krążenia, łagodnej do umiarkowanej niewydolności wątroby lub nerek.. Nerkowa moczówka prosta.

### Dawkowanie:

Indywidualnie w zależności od obrazu klinicznego i reakcji chorego.

### Działanie:

Lek o działaniu moczopędnym i hipotensyjnym o przedłużonym działaniu.

### Skład:

1 tabletkę zawiera 50 mg chlortalidonu.

### Przeciwwskazania:

Ciężka niewydolność wątroby i nerek, bezmocz, nadwrażliwość na chlortalidon i inne pochodne sulfonamidu, nawracająca hipokalemia i hiponatremia, hiperkalcemia i hiperurykemia objawowa.

### Działania niepożądane:

W zalecanych dawkach chlortalidon jest zwykle dobrze przyjmowany, jednak przy stosowaniu większych dawek może wystąpić: hipokalemia, hiponatremia, hipomagnezemia, zasadowica hipochloremiczna, hiperkalcemia, pokrzywka uczuleniowa, inne postacie wysypki, nadwrażliwość na światło, cholestaza wewnątrzwątrobowa, żółtaczką, podciśnienie ortostatyczne, arytmia, zawroty głowy, parestezje, brak łaknienia, nudności, wymioty, skurcze żołądka, biegunka lub zaparcia, zapalenie trzustki, hiperurykemia, hiperglikemia, cukromocz lub pogorszenie równowagi metabolicznej u chorych z cukrzycą, wzrost stężenia lipidów, trombocytopenia, leukopenia, agranulocytoza, eozynofilia, idiosynkrazja, impotencja, zaburzenia wzroku.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.