

Ibufen dla dzieci Forte o smaku truskawkowym, 40 ml

Nasza cena: 13,80 zł



Opis słownikowy

Dawka	0,2 G/5ML
Opakowanie	40ml
Postać	ZAW.
Producent	POLPHARMA S.A. STAROGARD GDAŃSKI POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	IBUPROFENUM

Opis produktu

Opis

Ibufen dla dzieci Forte o smaku truskawkowym, 40 ml

Ibufen dla dzieci forte to lek należący do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) stosowany w przypadku gorączki oraz bólu różnego pochodzenia.

Smak: truskawkowy.

Dawkowanie - Ibufen dla dzieci Forte o smaku truskawkowym, 40 ml

Zazwyczaj stosowana dawka:

- Dzieci od 1 do 2 lat (10-12 kg): dawka początkowa 2,5 ml. Potem w razie potrzeby 2,5 ml co 8 godzin. Maksymalna dawka dobową wynosi 7,5 ml.
- Dzieci od 3 do 5 lat (13-19 kg): dawka początkowa 2,5 ml. Potem w razie potrzeby 2,5 ml co 6 godzin. maksymalna dawka dobową wynosi 10 ml.
- Dzieci od 6 do 9 lat (20-29 kg): dawka początkowa 5 ml. Potem w razie potrzeby 5 ml co 8 godzin. Maksymalna dawka dobową wynosi 15 ml.
- Dzieci od 10 do 12 lat (30-39 kg): dawka początkowa 5 ml. Potem w razie potrzeby 5 ml co 6 godzin. maksymalna dawka dobową wynosi 20 ml.
- Dzieci i młodzież od 12 lat oraz dorośli: dawka początkowa 5 ml do 10 ml. Potem w razie potrzeby 5 ml do 10 ml co 6 do 8 godzin. Maksymalna dawka dobową wynosi 30 ml.

Składniki - Ibufen dla dzieci Forte o smaku truskawkowym, 40 ml

Substancją czynną leku jest ibuprofen, 5 ml zawiesiny zawiera 200 mg ibuprofenu,

substancje pomocnicze m.in.: glicerol, sodu benzoesan, maltitol ciekły.

Działania

Przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne.

Wskazania - Ibufen dla dzieci Forte o smaku truskawkowym, 40 ml

Lek Ibufen dla dzieci Forte jest przeznaczony do stosowania u dzieci, młodzieży i osób dorosłych w następujących przypadkach:

- gorączka różnego pochodzenia (także w przebiegu zakażeń wirusowych),
- bólé różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego (także bólé uszu występujące w stanach zapalnych ucha środkowego).

Przeciwwskazania - Ibufen dla dzieci Forte o smaku truskawkowym, 40 ml

Nie stosować leku:

- jeśli pacjent ma uczulenie na którykolwiek ze składników produktu
- jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowała duszność, astma, nieżyt nosa lub pokrzywka po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych podobnych leków przeciwbólowych
- jeśli u pacjenta występuje lub występowało w przeszłości owrzodzenia żołądka i (lub) dwunastnicy, lub krwawienie z żołądka (lub występowały dwa lub więcej epizody)
- jeśli u pacjenta występowało krwawienie, związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ
- jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką chorobę wątroby, nerek lub niewydolność serca
- nie podawać dzieciom o masie ciała poniżej 10 kg (do 1 roku życia)
- jeśli u pacjenta występują zaburzenia krzepnięcia krwi
- jeśli u pacjenta stwierdzono krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienia
- jeśli u pacjenta występuje ciężkie odwodnienie
- w okresie ostatnich trzech miesięcy ciąży
- jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie inne niesteroidowe leki przeciwzapalne.

Przeciwwskazania - Ibufen dla dzieci Forte o smaku truskawkowym, 40 ml

Jak każdy lek Ibufen dla dzieci forte może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują. Lek Ibufen dla dzieci forte jest na ogół dobrze tolerowany, jednak w trakcie jego stosowania mogą wystąpić działania niepożądane.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.