

Ibum Forte Pure zawiesina doustna 100 g



Nasza cena: 29,68 zł

Opis słownikowy

Dawka	0,2 G/5ML
Opakowanie	100 g
Postać	ZAW.DOUST.
Producent	HASCO-LEK, WROCŁAW POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	IBUPROFENUM

Opis produktu

Opis

Ibum Forte Pure jest lekiem w postaci zawiesiny dostępnym bez recepty.

Wskazania do stosowania leku:

- Stany gorączkowe (różnego pochodzenia)
- Łagodzi objawy przeziębienia i grypy (gorączkę)
- Obniża temperaturę, która może towarzyszyć odczynowi poszczepiennemu
- Bóle o słabym lub umiarkowanym nasileniu:
 - bóle głowy, gardła i mięśni (np. w przebiegu zakażeń wirusowych),
 - bóle stawów i kości (np. na skutek urazów narządu ruchu),
 - bóle na skutek urazów tkanek miękkich,
 - bóle pooperacyjne,
 - bóle zębów,
 - bóle po zabiegach stomatologicznych,
 - bolesne ząbkowanie,
 - bóle uszu występujące w stanach zapalnych ucha środkowego.

Dawkowanie:

Dawkowanie leku oraz jego podanie należy skonsultować z pediatrą.

Niemowlęta w wieku

- 3–6 mies. (5–7,6 kg mc.) 50 mg 3 ×/d;

- 6–12 mies. (7,7–9 kg mc.) 50 mg 3–4 ×/d.

Dzieci

- 1–3 lat (10–15 kg mc.) 100 mg 3 ×/d;
- 4–6 lat (16–20 kg mc.) 150 mg 3 ×/d;
- 7–9 lat (21–29 kg mc.) 200 mg 3 ×/d;
- 10–12 lat (30–40 kg mc.) 300 mg 3 ×/d;
- >40 kg mc. 300–400 mg 3–4 ×/d (maks. 1,2 g/d).

Preparat Ibum Forte Pure nie zawiera aromatów, barwników oraz cukru.

Kiedy nie stosować leku?

- Jeśli występuje nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu,
- W przypadku choroby wrzodowej żołądka i/lub dwunastnicy czynna albo w wywiadzie,
- Jeśli występuje perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego, w tym po zastosowaniu NLPZ,
- W trakcie ciężkiej niewydolności wątroby, nerek lub serc,
- Jeśli stwierdzono zaburzenia krzepnięcia, skazy krwotocznej, krwawienia z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie,
- zaburzenia krwiotworzenia o nieustalonej przyczynie (np. małopłytkowość),
- objawy nadwrażliwości (nieżyt nosa, pokrzywka, skurcz oskrzeli lub astma oskrzelowa) po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ w wywiadzie,
- równoległe stosowanie innych NLPZ, w tym inhibitorów COX-2,
- W trakcie III trymestru ciąży.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.