

# Ibum Forte, zawiesina doustna o smaku malinowym, 100g



Nasza cena: 29,68 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	100 g
Postać	ZAW.DOUST.
Producent	HASCO-LEK, WROCŁAW POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	IBUPROFENUM

## Opis produktu

### Opis

Lek przeciwbólowy, przeciwgorączkowy i przeciwzapalny od 3 miesiąca życia o smaku malinowym.

### Składniki - Ibum Forte, zawiesina doustna o smaku malinowym, 100g

5 ml zawiera: ibuprofen 200 mg oraz: maltitol ciekły, glicerol, guma ksantan, sacharyna sodowa, sodu benzoesan, kwas fumarowy, disodu fosforan dwunastowodny, aromat malinowy, woda oczyszczona.

### Wskazania - Ibum Forte, zawiesina doustna o smaku malinowym, 100g

Stany gorączkowe różnego pochodzenia, między innymi w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych, a także w przebiegu odczynu poszczipennego.

Bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego, takie jak: bóle głowy, gardła i mięśni (np. w przebiegu zakażeń wirusowych), bóle zębów, bóle po zabiegach stomatologicznych, bóle na skutek ząbkowania, bóle stawów i kości, na skutek urazów narządu ruchu (np. skręcenia), bóle na skutek urazów tkanek miękkich, bóle pooperacyjne, bóle uszu występujące w stanach zapalnych ucha środkowego.

### Przeciwwskazania - Ibum Forte, zawiesina doustna o smaku malinowym, 100g

Nadwrażliwość na ibuprofen lub którykolwiek ze składników produktu leczniczego; nie stosować u osób, u których w trakcie leczenia kwasem acetylosalicylowym lub innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) występowały w przeszłości jakiejkolwiek objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki lub astmy oskrzelowej; choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy czynna lub w wywiadzie, perforacja lub krwawienie, również występujące po zastosowaniu NLPZ; ciężka niewydolność wątroby, ciężka niewydolność nerek lub ciężka niewydolność serca; nie stosować ibuprofenu jednocześnie z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym inhibitorami COX-2 ; III trymestr ciąży; skaza krwotoczna.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.