

Ibum, żel, 100 g



Nasza cena: 30,28 zł

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Opakowanie | 100 g |
| Postać | ZEL |
| Producent | HASCO-LEK, WROCŁAW POLSKA [PL] |
| Rejestracja | Lek bez recepty |
| Substancja czynna | IBUPROFENUM, MENTHOLUM |

Opis produktu

Opis

Dawkowanie - Ibum, żel, 100 g

Lek stosuje się miejscowo. Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: nakładać 5 cm do 12 cm żelu (50 mg do 125 mg ibuprofenu) do 3 razy na dobę na bolące miejsce. Żel należy delikatnie wsmarowywać aż do całkowitego wchłonięcia. Po zastosowaniu leku należy dokładnie umyć ręce. Nie należy stosować żelu częściej niż co 4 godziny w ciągu doby i nie dłużej niż 2 tygodnie, o ile lekarz nie zaleci inaczej. Dzieci poniżej 12 roku życia: leku nie należy stosować u dzieci poniżej 12 roku życia bez zaleceń lekarza.

Składniki - Ibum, żel, 100 g

1 g żelu zawiera - ibuprofen 50 mg, lewomentol 30 mg.
substancje pomocnicze: glicerol, etanol 96%, polisorbát 20, Karbomer, aminometylopropanol, woda oczyszczona.

Działania

Wywiera skojarzone działanie zawartych w nim substancji czynnych: ibuprofenu i lewomentolu.

Wskazania - Ibum, żel, 100 g

Preparat przeznaczony jest do objawowego leczenia:

- bólów mięśniowych,
- bólu pleców,
- bólu towarzyszącego chorobom układu mięśniowo-kostnego, takim jak lekkie postaci zapalenia stawów, skręcenia, urazy sportowe,
- nerwobólów.

Przeciwwskazania - Ibum, żel, 100 g

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne.
Występowanie w wywiadzie skurczu oskrzeli, nieżytu nosa lub pokrzywki w związku z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Zgłaszano następujące działania niepożądane:

- zaburzenia układu immunologicznego: nadwrażliwość
- zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wysypka, świąd, pokrzywka, zaczerwienienie, rzadko obrzęk, dermatoza
- zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: astma, skurcz oskrzeli, duszność
- zaburzenia żołądka i jelit: ból brzucha i niestrawność.

Uwagi

Ciąża i karmienie piersią:
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.