

# Ibupar Forte, 400mg, 10 tabletek



Nasza cena: 8,04 zł

## Opis słownikowy

Dawka	0,4G
Opakowanie	*10
Postać	Tabletki
Producent	POLFA PABIANICE POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	IBUPROFENUM

## Opis produktu

### Opis

#### Dawkowanie - Ibupar Forte, 400mg, 10 tabletek

1 tabletkę po 400 mg jednorazowo, lub 3 do 4 razy na dobę w miarę potrzeby. Leku nie należy stosować dłużej niż 10 dni w leczeniu bólu oraz 3 dni w leczeniu gorączki bez konsultacji z lekarzem.

#### Składniki - Ibupar Forte, 400mg, 10 tabletek

1 tabletkę zawiera ibuprofen 400 mg oraz substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia ziemniaczana, krzem dwutlenek koloidalny, kroscarmeloza sodowa, alkohol poliwinylowy, sodu laurylosiarczan, sodu stearylofumarat.  
Skład otoczki: hypromeloza, hydroksypropyloceluloza, makrogl 4000, lak z żółcią pomarańczową, czerwień koszełkowa.

#### Wskazania - Ibupar Forte, 400mg, 10 tabletek

Preparat stosowany w bólach słabych i umiarkowanych różnego pochodzenia: bóle głowy, bóle zębów, mięśni, kości, stawów, bóle pourazowe oraz towarzyszące przeziębieniu i grypie, gorączce różnego pochodzenia, w bolesnym miesiączkowaniu, łagodni objawy przeziębienia i grypy.

#### Przeciwwskazania - Ibupar Forte, 400mg, 10 tabletek

- nadwrażliwość na składniki preparatu,
- czynna lub występująca w przeszłości choroba wrzodowa,
- ciężka niewydolność wątroby, nerek, serca,
- występujące w przeszłości objawy alergii po przyjęciu leków z grupy NLPZ.

#### Przeciwwskazania - Ibupar Forte, 400mg, 10 tabletek

Często: wysypki, w tym plamisto-grudkowe; zmniejszenie łaknienia.

Niezbyt często: niestrawność, ból brzucha, nudności, bóle w nadbrzuszu, bóle kurczowe w jamie brzusznej, dyskomfort w nadbrzuszu, zgaga; ból głowy; mroczki, niewyraźne widzenie, podwójne widzenie, zaburzenia widzenia barwnego; pokrzywka, świąd, łysienie; zespół objawów z bólami brzucha, gorączką, dreszczami, nudnościami i wymiotami; suchość błony śluzowej jamy ustnej, owrzodzenia dziąseł, nieżyt nosa.

Rzadko: biegunka, wzdęcia, zaparcia, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka; zawroty głowy, bezsenność lub senność, pobudzenie, nerwowość i uczucie zmęczenia.

Bardzo rzadko: smoliste stolce, krwiste wymioty, wrzodziejące zapalenia błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia okrężnicy i choroby Crohna; jałowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zaburzenia świadomości; depresja, zaburzenia emocjonalne; szumy uszne,

zaburzenia słuchu; azotemia, krwimocz, niewydolność nerek, w tym ostra niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych, zmniejszenie klirensu kreatyniny, wielomocz, zmniejszenie ilości wydalanego moczu, zwiększenie stężenia sodu w surowicy (retencja sodu); zaburzenia czynności wątroby, dodatnie testy czynnościowe wątroby, szczególnie podczas długotrwałego stosowania, zapalenie wątroby, żółtaczką; agranulocytoza, niedokrwistość aplastyczna, niedokrwistość hemolityczna, niekiedy z dodatnim odczynem Coombsa, eozynofilia, leukopenia, neutropenia, trombocytopenia z plamicą lub bez, zmniejszenie stężenia hemoglobiny lub hematokrytu; rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozplywna naskórka; ostre reakcje nadwrażliwości takie jak: obrzęk twarzy, języka, krtani, duszność, niedociśnienie tętnicze, częstoskurcz lub ostry wstrząs, reakcje bronchospastyczne, zaostrzenie astmy, skurcz oskrzeli. Podczas stosowania wysokich dawek NLPZ odnotowano występowanie obrzęków, nadciśnienia i niewydolności serca. Przyjmowanie ibuprofenu szczególnie długotrwałe w dużych dawkach (2400 mg/dobę), może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca, udar).

## Uwagi

Przed zastosowaniem w ciąży należy poradzić się lekarza.

O tym co powoduje ból głowy i jakie są jego przyczyny dowiedzą się Państwo z artykułu "O czym świadczy ból głowy?"

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**