

Ibuprom, 200 mg, 10 tabletek



Nasza cena: 10,45 zł

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Dawka | 200MG |
| Opakowanie | *10 |
| Postać | Tabletki |
| Producent | US PHARMACIA SP. Z O.O. POLSKA [PL] |
| Rejestracja | Lek bez recepty |
| Substancja czynna | IBUPROFENUM |

Opis produktu

Opis

Lek przeciwbólowy i przeciwzapalny.

Dawkowanie - Ibuprom, 200 mg, 10 tabletek

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: w doraźnym leczeniu: 1 do 2 tabletek doustnie co 4 do 6 godzin (nie należy stosować ilości większej niż 6 tabletek na dobę). Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Osoby w podeszłym wieku: nie jest wymagana modyfikacja dawkowania. W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Składniki - Ibuprom, 200 mg, 10 tabletek

(1 tabletki): ibuprofen 200 mg oraz substancje pomocnicze m.in. sacharozę.

Działania

Jest silnym lekiem przeciwbólowym i przeciwzapalnym, który precyzyjnie lokalizuje źródło bólu (jakim często jest stan zapalny) i na nim koncentruje swoją siłę działania. Dzięki temu szybko zwalcza różnego rodzaju bóle.

Wskazania - Ibuprom, 200 mg, 10 tabletek

Bóle różnego pochodzenia: bóle miesiączkowe, mięśniowe, pourazowe, bóle głowy, zębów, gardła, bóle krzyża, rwa kulszowa, bóle reumatyczne oraz gorączka.

Przeciwwskazania - Ibuprom, 200 mg, 10 tabletek

- nadwrażliwość na ibuprofen, lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku, na kwas acetylosalicylowy lub inny lek z grupy NLPZ,
- czynna lub przebyta choroba wrzodowa,
- skaza krwotoczna,
- ciężka niewydolność wątroby lub nerek,
- ciężka niewydolność serca,
- wiek do 12 lat,
- III trymestr ciąży,
- jednoczesne stosowanie innych NLPZ, w tym inhibitorów COX-2.

Przeciwwskazania - Ibuprom, 200 mg, 10 tabletek

Nudności, wymioty, zgaga, świąd, wysypka, obrzęk, nadciśnienie. W przypadku wystąpienia innych niż wymienionych działań niepożądanych należy poinformować o nich lekarza.

Uwagi

O tym co powoduje ból głowy i jakie są jego przyczyny dowiedzą się Państwo z artykułu "O czym świadczy ból głowy?"

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.