

Ibuprom Ultramax 600 mg, 10 tabletek

Nasza cena: 14,56 zł



Opis słownikowy

Dawka	600MG
Opakowanie	*10
Postać	TABL.POWL.
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	IBUPROFENUM

Opis produktu

Opis

Ibuprom Ultramax 600 mg, 10 tabletek

Ibuprom Ultramax to lek o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwgorączkowym.

Wskazania:

Do doraźnego, krótkotrwałego stosowania u dorosłych, w ostrych, umiarkowanych bólach różnego pochodzenia:

- bóle głowy (w tym także migreny)
- bóle zębów
- bóle mięśniowe i kostne (w tym także bóle pleców)
- bóle pourazowe i pooperacyjne, w tym związane z zabiegiem stomatologicznym
- nerwobóle
- bolesne miesiączkowanie

Dawkowanie:

Zalecana dawka to 600 mg ibuprofenu (1 tabletkę) jednorazowo. W razie potrzeby dawkę jednorazową 600 mg (1 tabletkę) można powtórzyć, zachowując odstęp 6-8 godzin. Maksymalna dawka dobową, bez konsultacji z lekarzem nie powinna przekroczyć 1200 mg (2 tabletki).

Przeciwwskazania:

Kiedy nie stosować leku Ibuprom Ultramax:

- jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub którykolwiek z pozostałych

- składników tego leku (wymienionych w punkcie 6), - jeśli pacjent miał kiedykolwiek duszność, astmę oskrzelową, katar sienny, obrzęk lub pokrzywkę po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych, podobnych leków przeciwbólowych (NLPZ)
- jeśli pacjent ma ciężką niewydolność serca
 - jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek, - jeśli u pacjenta występują niewyjaśnione zaburzenia krwiotworzenia
 - jeśli u pacjenta występuje krwawienie do mózgu lub inne czynne krwawienie
 - jeśli u pacjenta wystąpiło kiedykolwiek krwawienie lub perforacja żołądka lub jelit po zastosowaniu NLPZ
 - jeśli pacjent ma, obecnie lub w wywiadzie, nawracające wrzody żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwawienie z przewodu pokarmowego (co najmniej dwa potwierdzone przypadki wrzodów lub krwawienia)
 - jeśli pacjent ma ciężkie odwodnienie (wywołane przez wymioty, biegunkę lub przyjmowanie niewystarczających ilości płynów)
 - jeśli pacjentka jest w ostatnim trymestrze ciąży
 - poniżej 18 lat.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Składniki:

Substancją czynną leku jest ibuprofen. Każda tabletkowa powleczona zawiera 600 mg ibuprofenu.

Pozostałe składniki to: rdzeń tabletki: hypromeloza 2910 (6mPas), kroskarmeloza sodowa, laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna i magnezu stearynian; otoczka tabletki: hypromeloza 2910 (6mPas), tytanu dwutlenek (E 171), talk i glikol propylenowy.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.