


Idroflog roztwór okulistyczny 15 AMP. PO 0,5 ML



Nasza cena: 45,14 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	15 AMP. PO 0,5 ML
Postać	ROZTW.
Producent	SOLINEA SP. Z O.O. SP.K. POLSKA [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

Idroflog roztwór okulistyczny 15 AMP. PO 0,5 ML

Idroflog to roztwór okulistyczny, który zawiera hialuronian sodu. Ma on właściwości mukomimetyczne oraz pseudoplastyczne, dzięki czemu równomiernie rozprawdza się po powierzchni oka i tworzy elastyczną ochronę. Tworząc "efekt bariery" stabilizuje film łzowy oraz zmniejsza tarcie spowodowane ruchami gałki ocznej oraz mruganiem powieki. W ten sposób ułatwia procesy naprawcze w obrębie uszkodzonych komórek nabłonka rogówki, które były spowodowane niedotlenieniem filmu łzowego.

Chroni rogówkę oka przed działaniem czynników zewnętrznych.

Zmniejsza ryzyko nawrotu stanów zapalnych.

Utrzymuje powierzchnię oka w prawidłowej kondycji.

Idroflog należy stosować pod bezwzględną kontrolą lekarza specjalisty przez ograniczony czas.

Składniki

Hialuronian sodu 2 mg/ml; fosforan sodowy hydrokortyzonu 10 µg/ml; cytrynian trisodowy; chlorek sodu; chlorek potasu; chlorek magnezu; fosforan sodu dwuzasadowy; fosforan sodu jednozasadowy; woda do wstrzykiwań.

Wyrób nie zawiera środków konserwujących.

Przeciwwskazania do stosowania Idroflog

Preparatu Idroflog nie należy stosować::

W przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składnik produktu lub inne substancje podobne pod względem chemicznym.

W przebiegu wirusowego zakażenia powierzchni oka, wrzodowego zapalenia rogówki, grzybicy oka, ropnego zapalenia spojówek,

ropnego i opryszczkowego zapalenia błony śluzowej oka, jęczmienia.
Idroflog – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

W rzadkich przypadkach zaobserwowano niewielkie zamglenie widzenia po podaniu, co jest spowodowane lepkością roztworu.

Podczas wprowadzania może wystąpić lekkie uczucie pieczenia. Uczucie to jednak ustąpi.

W przypadku utrzymywania się objawów należy skontaktować się z lekarzem okulistą. Przestrzeganie zaleceń zawartych w ulotce dołączonej do opakowania zmniejsza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Dawkowanie

IDROFLOG dawkuje się indywidualnie w zależności od stanu zdrowia oraz zaleceń lekarza okulisty. Zazwyczaj należy wprowadzić 1-2 krople roztworu do worka spojówkowego leczonego oka, od 2 do 4 razy na dobę. Całkowity czas trwania leczenia wynosi 2-6 miesięcy. Musi on jednak zostać określony oraz stale kontrolowany przez lekarza specjalistę (zaleca się wizytę kontrolną co 30-45 dni).

Sposób stosowania Idroflog

Odłączyć pojedynczą ampułkę z paska. Oderwać górną nasadkę, przekręcając ją. Aplikować 1-2 krople do worka spojówkowego. Zakraplać, kierując wzrok do góry. IDROFLOG może być również stosowany podczas jednoczesnego użytkowania soczewek kontaktowych.

Środki ostrożności

Idroflog jest przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego.

Idriflog nie należy stosować bezpośrednio przed podaniem środków wykorzystywanych w celach leczniczych oraz przez dwadzieścia minut po zastosowaniu jakiegokolwiek miejscowej farmakoterapii. Jeśli podczas leczenia wystąpi pogorszenie objawów ze strony narządu wzroku, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Długotrwałe stosowanie może powodować negatywne skutki. Dlatego też całkowity czas trwania leczenia musi być określony przez lekarza okulistę.

W przypadku stanu zapalnego lekarz specjalista zdecyduje o odpowiedniej terapii przeciwzapalnej, aby przywrócić fizjologiczny stan powierzchni oka. W celu zredukowania ryzyka zakażenia podczas stosowania, foliową saszetkę należy otwierać tylko bezpośrednio przed podaniem produktu. Unikać bezpośredniego kontaktu końcówki ampułki z palcami, okiem oraz wszelkiego rodzaju innymi powierzchniami.

Idroflog należy przechowywać w temperaturze od 2°C do 25°C.

Produkt nie zawiera konserwantów. Produkt jednorazowego użytku: po pierwszym zastosowaniu należy wyrzucić ampułkę, nawet jeśli zawiera resztki roztworu.

Idroflog należy stosować wyłącznie po uzyskaniu porady lekarza specjalisty.

Przyjmowanie Idroflog w czasie ciąży

Zasadniczo przeciwwskazany w ciąży i w okresie karmienia piersią.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.